

Veille sanitaire internationale	
Note bilan	20/10/2020

Peste équine en Malaisie et Thaïlande

Cette note reprend les informations de la [précédente note](#) mise en ligne le 08/09/2020. Les nouvelles informations sont matérialisées en surligné gris.

Déjà présente en Thaïlande depuis le 27/03/2020, la peste équine a émergé en Malaisie le 06/08/2020.

La maladie a été confirmée, mais le sérotype n'a pas encore été identifié en Malaisie. Étonnamment, aucun cas de mortalité n'a été rapporté, et les chevaux malades n'ont pas été euthanasiés.

Une enquête épidémiologique visant à déterminer la source de virus est en cours. L'hypothèse la plus probable serait une introduction depuis le Sud de la Thaïlande par des mouvements non contrôlés d'équidés et une amplification virale par les populations locales de *Culicoides*.

Pour le comité de rédaction de la Plateforme ESA (par ordre alphabétique) :

Julien Cauchard, Céline Dupuy, Guillaume Gerbier, Renaud Lancelot, Yves Lambert

Pour le Laboratoire national de référence - Anses Maisons-Alfort : *Stephan Zientara*

Auteur correspondant : *renaud.lancelot@cirad.fr*

Source : *Informations données par le Cirad - C. Garros, T. Baldet, S. Falala, F. Roger et R. Lancelot*

La peste équine (PE) est une maladie virale due à un Orbivirus (*Reoviridae*), transmise par des moucheron hématophages du genre *Culicoides* (*Diptera*, *Ceratopogonidae*). Elle touche les équidés domestiques et sauvages (chevaux, mules, ânes et zèbres), avec des atteintes graves, souvent mortelles, chez les chevaux. Elle n'est pas transmissible à l'Homme. On distingue neuf sérotypes différents de virus de la peste équine.

L'Europe est indemne

La maladie est enzootique en Afrique subsaharienne. Elle a fait une incursion en dehors de son bassin d'origine au début de la seconde moitié du XX^{ème} siècle, avec l'apparition de foyers en Afrique du Nord et en Europe du Sud, au Moyen-Orient, au Pakistan et en Inde. En 1987, des foyers - causés par le sérotype 4 du virus de la PE, sont apparus en Espagne à la suite de l'importation de zèbres asymptomatiques provenant de Namibie, provoquant aussi une circulation du virus jusqu'en 1990 au Portugal et au Maroc. L'Europe est aujourd'hui indemne, la maladie ayant été éradiquée en 1991 grâce à des campagnes de vaccination dans la péninsule ibérique [1].

La peste équine présente en Thaïlande depuis le 27 mars 2020

Le 27/03/2020, une notification de peste équine a été faite à l'OIE par la Thaïlande sur la base

de résultats positifs de tests de mise en évidence du génome viral, confirmés par le laboratoire de référence de l'OIE (Pirbright Institute, UK). Cela concernait un élevage de 1 171 équidés qui avait été suspecté dès le 24/02/2020 et dont 436 chevaux étaient morts (Source : [Notification OIE du 03/04/2020](#)). La souche virale appartenait au sérotype 1, avec une proximité phylogénétique avec les souches sud-africaines et de Namibie (Source : [notification OIE du 14/10/2020](#)). Cette émergence représentait la première introduction connue d'un virus de la peste équine en Asie du Sud-Est. Une campagne de vaccination des équidés contre la PE a débuté le 20/04/2020 et des moyens de lutte et de protection anti-vectorielles ont été mis en place [2] ([notification OIE du 08/05/2020](#)). En raison de l'absence de disponibilité de vaccin inactivé contre le sérotype 1 à l'échelon mondial, un vaccin polyvalent atténué contenant trois sérotypes (dont le sérotype 1) produit en Afrique du sud a été utilisé. Plus de 9 800 chevaux ont été vaccinés entre le 20/04 et le 04/09/2020 sur une population totale de 16 890 chevaux (Sources : [notification OIE du 04/09/2020](#), [présentation OIE du 09/06/2020](#)). La Thaïlande a notifié par la suite d'autres foyers à l'OIE le [27/03/2020](#) (n=2), le 10/04/2020 (n=2), le 17/04/2020 (n=1), le [24/04/2020](#) (n=1), le [01/05/2020](#) (n=1), le 05/05/2020 (n=2), le [22/05/2020](#) (n=2), le [19/06/2020](#) (n=1), le 26/06/2020 (n=2). Quinze foyers ont ainsi été notifiés entre le 27/03 et le 26/06/2020. Le 14/10/2020 deux nouveaux foyers ont été notifiés. Le premier sur un équidé suspecté le 11/08/2020 dans une exploitation de sept équidés et dont le diagnostic a été confirmé le 14/08/2020. Le second a été confirmé le 10/09/2020 suite à une suspicion en date du 01/09/2020 concernant deux zèbres de Chapman (*Equus quagga chapmani*) situés dans un parc zoologique où 54 autres zèbres sont présents (Source : [notification OIE du 14/10/2020](#)). Ceci porte à dix-sept le nombre de foyers notifiés depuis le 27/03/2020.

Culicoides imicola, vecteur majeur du virus de la PE en Afrique et dans le bassin méditerranéen étant présent en Thaïlande, il est fortement suspecté d'être au moins l'un des vecteurs locaux. L'origine de l'introduction du virus envisagée dès le début de l'épizootie était via l'importation de zèbres porteurs sains (source : [média au 23/05/2020](#)). D'après les données des autorités thaïlandaises, des importations de zèbres en provenance d'Afrique du Sud ont eu lieu en juillet 2019, janvier 2020 et mars 2020 (Source : [notification OIE du 14/10/2020](#)).




Figure 1. Foyers de peste équine rapportés en Thaïlande depuis mars 2020 et nouveau foyer rapporté en Malaisie le 02/09/2020. La couleur des triangles représentant les foyers est d'autant plus sombre qu'ils sont anciens. Sources des données sur les foyers : bases de données EMPRES_I (FAO) et WAHIS (OIE), consultées le 20/10/2020.

Emergence en Malaisie le 6 août 2020

Le 06/08/2020, un propriétaire de chevaux informe les services vétérinaires de Malaisie (province de Terengga, dans la partie occidentale et continentale du pays: fig. 1) que ses cinq chevaux présentent des difficultés respiratoires et des boiteries. Des échantillons de sang prélevés sur quatre chevaux atteints sont testés positifs pour la présence de génome viral du virus de la PE par l'Institut de recherche vétérinaire (VRI) d'Ipoh. Le sérotype n'a pas encore été identifié. Une nouvelle enquête virologique menée le 31/08/2020 a révélé que les cinq chevaux étaient infectés de peste équine. Étonnamment, aucun cas de mortalité n'a été rapporté, et les chevaux malades n'ont pas été euthanasiés (OIE, [rapport de notification immédiate](#) n°35575 du 02/09/2020).

Une enquête épidémiologique visant à déterminer la source de virus est en cours. L'hypothèse la plus probable serait une introduction depuis le Sud de la Thaïlande par des mouvements non contrôlés d'équidés et une amplification virale par les populations locales de *Culicoides*. Le Sud de la Thaïlande est en effet touché par des troubles socio-politiques rendant délicates les opérations de surveillance et de contrôle des maladies et de la mobilité animale. L'analyse

phylogénétique du virus malaisien permettrait d'étayer cette hypothèse et d'écarter celle d'une réversion de la souche vaccinale vivante atténuée utilisée en Thaïlande.

Références

1. Zientara S, Ponçon N, Martínez-López B, Sánchez-Vizcaíno, J.M. La peste équine : de l'expérience espagnole au risque pour la France. Bulletin épidémiologique, santé animale et alimentation, 2012, n°49 : 26-29. <https://be.anses.fr/sites/default/files/BEP-mg-BE49-art12.pdf>
2. King S, Rajko-Nenow P, Ashby M, Frost L, Carpenter S, Batten C. Outbreak of African horse sickness in Thailand, 2020. Transboundary and Emerging Diseases. 2020; n/a. doi:[10.1111/tbed.13701](https://doi.org/10.1111/tbed.13701) <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/tbed.13701>

Pour aller plus loin

Zientara S, Lecollinet S, Weyer CT (2015) African horse sickness. Revue scientifique et technique (International Office of Epizootics) 34(2):315-327
<http://web.oie.int/boutique/extrait/01zientara315327.pdf>

Ce document créé dans le cadre de la Plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale (ESA) peut être utilisé et diffusé par tout média à condition de citer la source comme suit et de ne pas apporter de modification au contenu « © <https://www.plateforme-esa.fr/> »