



BHVSI-SA

du 13/09/2022 semaine du 05 au 11/09/2022

Bulletin Hebdomadaire de Veille Sanitaire
Internationale - Santé Animale

SOMMAIRE

Le BHVSI-SA rapporte et met en perspective des signaux et des alertes en santé animale au niveau national et international. Pour accéder à la thématique souhaitée, [cliquez directement sur le titre.](#)



| | | |
|--|--|---|
| | | <u>Aethina tumida sur l'île de la Réunion</u> : pas d'évolution du nombre de foyers. |
| | | <u>Influenza aviaire hautement pathogène en Europe</u> : trois cas sauvages détectés dans l'Ain. |
| | | <u>Peste porcine africaine en Europe</u> : poursuite des détections en Italie et en Allemagne. |
| | | <u>Fièvre de West Nile en Europe</u> : premières détections en Croatie. |
| | | <u>Dangers sanitaires à actualité réduite</u> : rage classique en Europe. |

Instructions de lecture : voir en fin de document.

Pour s'abonner



PAS D'EVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS

Les essentiels

- Douze foyers d'*Aethina tumida* ont été confirmés au 11/09 dans le sud de l'île de la Réunion (communes de Saint-Pierre, de Saint-Philippe et de Saint-Joseph). Aucun nouveau foyer détecté depuis le 19/07/2022. Le premier foyer avait été détecté le 05/07/2022 dans un rucher sur la commune de Saint-Pierre. Il s'agissait de la première détection de ce ravageur sur le territoire national jusque-là indemne.

Fiche rédigée en collaboration avec le LNR de l'Anses¹, la DGAL², la DAAF de la Réunion³ et le GDS Réunion⁴

Une note brève a été publiée sur le site de la plateforme ESA le 08/07/2022 ([lien](#)). Cette fiche reprend les éléments de départ et présente l'évolution de la situation depuis le 05/07/2022.

Le 05/07/2022, la Direction de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt (DAAF) de La Réunion a été informée d'une suspicion de présence d'individus adultes d'*Aethina tumida* (le petit coléoptère des ruches), dans un rucher du sud de l'île (entre les communes de Saint-Louis et de Saint Pierre). Suite aux prélèvements réalisés, la présence de ce ravageur a été confirmée le 06/07/2022 par le Laboratoire national de référence (LNR) de l'Anses Sophia-Antipolis. Le diagnostic a été effectué par analyses morphologiques et comportementales établies à partir de photographies et vidéos prises par le GDS local et le Cirad et transmises en urgence au LNR par les services de l'État. Des coléoptères adultes ont été détectés dans trois colonies sur les dix-sept présentes au sein du rucher foyer et aucun œuf ou larve n'a été mis en évidence. Des prélèvements, transportés par avion, ont fait l'objet d'examen complémentaires par le LNR. Les analyses moléculaires (par PCR) ont confirmé l'identification de l'espèce *A. tumida*. Des investigations par séquençage sont également en cours afin d'essayer de déterminer l'origine géographique des spécimens détectés (source : LNR le 18/07/2022).

Il s'agit de la première découverte de cette espèce sur le territoire national jusque-là indemne.

En date du 11/09/2022, douze foyers d'infestation par *A. tumida* ont été confirmés et notifiés dans le sud de l'île (Figure 1) (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022). Sur la commune de Saint-Philippe, située à environ 30 km à l'est de Saint-Pierre (lieu de détection du premier cas), dix foyers ont été confirmés dans la zone réglementée de 5 km autour du foyer initial (identifié le 07/07/2022), dont deux avec des larves. Un foyer a été également détecté sur la commune de Saint-Joseph (située entre Saint-Pierre et Saint-Philippe), le 19/07/2022 (source : Commission Européenne ADIS et DAAF de La Réunion le 25/07/2022). La présence de larves indique que le parasite a déjà initié au moins un cycle reproductif sur le territoire (le stade larvaire dure 10 à 16 jours) (source : LNR le 18/07/2022).

Aethina tumida est un ravageur des colonies d'abeilles et de bourdons, catégorisé « D et E » dans l'Union européenne (règlement 2018/1882). Ce coléoptère est originaire d'Afrique sub-saharienne. Il est présent en Calabre (Italie) depuis 2014 et a été détecté à l'île Maurice (proche de La Réunion) en 2017 (Muli et al 2018) ; il est également présent à Madagascar. En France, ce ravageur est assimilé à une maladie de catégorie A.

¹ Véronique Duquesne, Stéphanie Franco

² Faycal Meziani, Cédric Sourdeau, Sébastien Wendling

³ Laurent-Xavier Delmotte, Laëtitia Thibaudeau

⁴ Stéphane Lacroix

⁵ Muli E, Kilonzo J & Sookar P (2018) Small Hive Beetle infestations in Apis mellifera unicolor Colonies in Mauritius Island, Mauritius, Bee World, 95:2, 44-45, DOI: 10.1080/0005772X.2018.1434751



L'origine de cette introduction n'a pas encore été identifiée. Des investigations épidémiologiques sont en cours et des visites approfondies sont réalisées dans les ruchers des zones réglementées et en lien épidémiologique avec le foyer confirmé, en application de l'arrêté préfectoral pris.

Au vu des informations épidémiologiques disponibles, l'objectif d'éradication est à ce stade envisagé. Des mesures de gestion adaptées à la situation ont immédiatement été prises par arrêté préfectoral. Les colonies des ruchers foyers ont été euthanasiées et incinérées, un traitement de sol est également mis en œuvre dès la fin des opérations de brûlage. Une zone réglementée de 10 km de rayon (zone de protection de 5 km et zone de surveillance de 5 km autour de la zone de protection) est mise en place autour des foyers. Les mesures prévues par l'arrêté ministériel du 23 décembre 2009 ([lien](#)), établissant les mesures de police sanitaire applicables aux maladies réputées contagieuses des abeilles, s'appliquent dans ces zones : recensement et examen des colonies d'abeilles, interdiction des déplacements de ruches, peuplées ou non, d'abeilles, de reines, de faux-bourçons, du matériel d'apiculture et de produits d'apiculture. Les périmètres de zones réglementées sont définis par arrêté en date du 01/08/2022 pour l'interdiction de circulation de ruches et matériel apicole secteur de Saint-Philippe, Saint-Joseph et Saint-Pierre ([Arrêté préfectoral N° SALIMPSPAE-2022-1027-D-2-D](#)).

Les acteurs locaux (services de l'État et partenaires, notamment GDS La Réunion) sont fortement mobilisés sur les actions de surveillance et d'éradication. Au 11/09/2022, 287 ruchers - 2 733 colonies (sur environ 1 200 ruchers sur l'île [lien](#)) ont été contrôlés (Figure 2 actualisée au 08/09/2022). Les opérations de surveillance ont été ralenties en raison de conditions climatiques défavorables (source : DGAL au 11/09/2022). L'Anses a été saisie par la DGAL le 05 août pour un avis relatif à « l'évaluation des mesures de gestion suite à la découverte du petit coléoptère des ruches, *Aethina tumida* et des conditions de leurs adaptations potentielles au regard de l'évolution de la situation épidémiologique ». La stratégie actuellement suivie pourra ainsi être adaptée aux vues des conclusions et recommandations de l'Anses.




Figure 1. Répartition des foyers d'*Aethina tumida* détectés depuis le 05/07/2022 sur l'île de la Réunion (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022)




Figure 2. Répartition des ruchers inspectés et zonage réglementé à la Réunion pour *Aethina tumida* en date du 08/09/2022 (source : DGAL le 08/09/2022).

Pour en savoir plus

Des informations sur le parasite et recommandations en cas de suspicion d'infestation sont disponibles sur le site internet du ministère en charge de l'Agriculture à l'adresse : <https://agriculture.gouv.fr/aethina-tumida-undanger-pour-les-abeilles>.

La carte interactive de la Plateforme ESA permet de suivre la présence d'*Aethina tumida* en Europe où il est présent exclusivement dans le sud de l'Italie continentale : <https://shiny-public.anses.fr/shiny-vsi/>.

Sur la filière apicole réunionnaise :

https://daaf.reunion.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/20211001_Filiere_Apiculture2020_cle41a687.pdf



TROIS CAS SAUVAGES DETECTES DANS L'AIN

Les essentiels

- **Europe** : persistance de la circulation du virus IAHP H₅N₁ sur le littoral ouest du continent au cours de ce qui constituait jusqu'à présent une intersaison pour l'activité IAHP.
- **Allemagne** : trois nouveaux foyers de volailles toujours en Basse-Saxe ; nombreuses notifications de cas sauvages dans le nord du pays.
- **France** : poursuites des notifications dans l'avifaune sauvage libre sur le littoral Atlantique. Trois cas détectés dans la faune sauvage le 03/09/2022 dans l'Ain.

Fiche rédigée en collaboration avec le LNR Influenza de l'Anses^[1] et l'OFB^[2]

Les informations traitées dans cette fiche couvrent une période allant du **01/08/2022** au dimanche précédent la date de publication du BHVSI-SA.

Les dates de bornage des saisons, du 1^{er} août année n au 31 juillet année n+1, sont définies en fonction des périodes de migration descendante (post-nuptiale) des oiseaux sauvages. Sur la base de la biologie des espèces concernées et des données de baguage des anatidés, les premiers migrateurs arrivant en France à partir du mois d'août (observations sporadiques en juillet).

- Un article du Bulletin épidémiologique de l'Anses / DGAL rédigé par l'OFB détaille ces phénomènes migratoires ([lien](#)).
- Les informations sur la saison 2021/2022 sont disponibles dans le [BHVSI du 02/08/2022](#).
- Un article bilan de la saison 2021/2022 sera rédigé au second semestre 2022.

ATTENTION – Changement de catégories d'espèces

Le système d'information de la commission européenne (ADIS) a évolué. Elle est entrée en vigueur le 25/07/2022.

Catégorisation des déclarations à l'ADIS

Selon la réglementation européenne, l'IAHP doit être notifiée quelle que soit la population atteinte.

Le règlement (UE) 2016/429, complété notamment par le règlement délégué 2020/2002 relatif aux notifications et rapports des maladies catégorisées définissent deux catégories de population dans le système ADIS :

- "Volailles" : les oiseaux élevés ou détenus en captivité aux fins de 1) production de viande, d'œufs ou autres produits, 2) la fourniture de gibier sauvage de repeuplement et l'élevage d'oiseaux [reproducteurs] utilisés pour les types de production visés aux deux points précités [point 9 de l'article 4 du règlement (UE) n°2016/429].
- "Autres que les volailles dont les oiseaux sauvages" (on entend par sauvage, tous les animaux qui ne sont pas détenus par l'Homme, y compris les animaux errants et les animaux devenus sauvages, même s'ils appartiennent à des espèces qui sont normalement domestiquées). Cette catégorie distingue à présent les "oiseaux captifs" qui rassemblent les oiseaux autres que des volailles, détenus en captivité à toute autre fin que celles définies pour la catégorie "Volaille" (incluant les basses-cours, les parcs zoologiques et les oiseaux d'ornement, y compris ceux qui sont détenus aux fins de spectacles, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente [point 10 de l'article 4 du règlement (UE) n°2016/429]). Deux sous-catégories figurent dans ADIS :
 - HPAI(Non-P) in Captive Birds, que nous nommerons « **oiseaux captifs** »
 - HPAI(Non-P) in Wild Birds, correspondant à l'avifaune sauvage libre, que nous nommerons « **avifaune sauvage** ».

Le système d'information WAHIS-OMSA ne faisant pas cette distinction, les déclarations dites « autres que les volailles, y compris les oiseaux sauvages » concernant les événements classés « basse-cour », « village » et « zoo » sont placés dans la catégorie « oiseaux captifs ».

Le document [Sources de données](#) précise la terminologie utilisée aux niveaux européen et international pour déclarer les cas et foyers d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) et la notion de pathogénicité des souches d'influenza au sens de l'OMSA.



La présente fiche décrit la situation sanitaire de l'IAHP en Europe.

Pour la saison 2022-2023, soit depuis le 01/08/2022, sont présentés dans cette fiche :

- La distribution géographique des cas et foyers, en figures 1 à 3,
- La répartition des foyers de volailles et des cas « autres » en France en figure 4,
- L'espèce concernée pour les déclarations chez les oiseaux sauvages libres dans le tableau 1,
- Le décompte des foyers « volailles » et cas « autres que volailles » détectés, dans le tableau 2.

• **Prévalence**

Depuis le 01/08/2022, 40 foyers de volailles (+11 par rapport à la semaine précédente), 26 (+5) cas chez les oiseaux captifs et 159 (+43) cas chez l'avifaune sauvage libre ont été détectés, tous de type H5N1 (sauf un H5Nx chez un spécimen sauvage), dans la continuité des observations faites lors de la saison 2021/2022 (sous-type H5N1 largement majoritaire représentant 99,5 % des souches typées au sein des foyers « volailles » et 98,4 % des cas « autres que volailles » lors de la saison 2021/2022) (source : LNR, Commission européenne ADIS le 12/09/2022).

• **Incidence**

L'incidence mensuelle glissante des foyers de volailles en Europe se maintient autour des mêmes valeurs, avec 30 foyers pour la période du 15/08/2022 au 11/09/2022.

L'incidence mensuelle glissante des cas sauvages demeure élevée, avec une valeur de 85 cas chez l'avifaune libre. La recrudescence inhabituelle observée aux mois de juin et juillet 2022, ainsi que la persistance des détections à un niveau remarquable depuis le début du mois d'août, sont très majoritairement dues aux détections de cas dans l'avifaune sur le littoral nord de l'Europe, qui s'étendent maintenant au littoral ouest (source : LNR, Commission européenne ADIS le 12/09/2022).




Figure 1. Localisation des cas ou foyers en avifaune sauvage, chez les oiseaux captifs et chez les volailles d'IAHP H5 en Europe ayant débuté dans le mois et la semaine précédant le 11/09/2022 inclus (source : DGAL, Commission européenne ADIS, WAHIS-OMSA, consultés le 12/09/2022). Encadré : voir zoom en figure 2.




Figure 2. Zoom sur les cas ou foyers en avifaune sauvage, chez les oiseaux captifs et chez les volailles d’IAHP H5 dans les pays côtiers de mer du Nord (Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, nord de l’Allemagne) ayant débuté dans le mois et la semaine précédant le 11/09/2022 inclus (source : DGAL, Commission européenne ADIS, WAHIS-OMSA, consultés le 12/09/2022).



Figure 3. Localisation des cas ou foyers en avifaune sauvage, chez les oiseaux captifs et chez les volailles d'IAHP H5 en Europe ayant débuté depuis le début de la saison, soit le 01/08/2022 (source : DGAL, Commission européenne ADIS, WAHIS-OMSA, consultés le 12/09/2022).

Allemagne

Dix foyers ont été détectés depuis le début de la saison, tous en Basse-Saxe. Trois nouveaux foyers ont été notifiés cette semaine. Ils ont été détectés entre le 02 et 09/09/2022, dans un élevage de poules pondeuses et deux élevages de dindes (source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022). Deux foyers avaient été détectés les 29 et 31/08/2022 dans un élevage de dindes et un élevage de poulets de chair (source : Commission européenne ADIS le 05/09/2022).

De nombreuses notifications de cas sauvages ont été faites (n=25) sur des événements détectés fin juillet et début août 2022, concernant des Sulidés, Laridés et Charadriidés dans le nord du pays (land Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg) (source : Commission européenne ADIS le 05/09/2022).

Belgique

Un deuxième cas sauvage a été détecté dans les Flandres à Alost chez un fuligule morillon (*Aythya fuligula*) le 08/08/2022, après celui détecté à Ostende le 05/08/2022 chez un faucon lanier (source : Commission européenne ADIS le 29/08/2022).

Cette semaine, six notifications sont classées dans la catégorie « oiseaux captifs ». Ces événements ont été détectés entre le 26 et 29/08/2022. L'un d'eux est situé à Clavier près de Liège et implique plusieurs espèces : plusieurs spécimens de faisan commun (*Phasianus colchicus*), une buse variable (*Buteo buteo*), une bernache du Canada (*Branta canadensis*) et un autour des palombes (*Accipiter gentilis*). Les cinq autres détections sont



situées en Flandre occidentale et concernent également plusieurs espèces, dont bernache du Canada (*branta canadensis*), goéland marin (*Larus marinus*) et canard souchet (*Spatula clypeata*) (source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022).

Espagne

Le premier foyer de la saison a été confirmé en Andalousie le 01/08/2022 au sein d'un élevage de volailles (source : Commission européenne ADIS le 16 /08/2022). Un second a été détecté le 19/08/2022 au sein d'un élevage de volailles (source : Commission européenne ADIS le 22/08/2022). Un nouveau foyer a été détecté dans un élevage de dindes en engraissement en Estrémadure le 26/08/2022 (source : Commission européenne ADIS le 05/09/2022).

Cinq nouveaux cas sauvages ont été détectés dans la communauté de Madrid (événement impliquant plusieurs espèces : cygne tuberculé (*Cygnus olor*), grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) et oie cendrée (*Anser anser*) le 22/08/2022, ainsi qu'en Galice les 31/07 et 15/08/2022, Cantabrie le 19/08/2022 et Pays-Basque le 31/08/2022, impliquant des fous de Bassan (*Morus basanus*) (source : Commission européenne ADIS le 05/09/2022). Cinq cas avaient été détectés entre le 10 et le 17/08/2022 chez des colverts (*Anas platyrhynchos*), oies cendrées (*Anser anser*) et Sarcelle d'hiver (*Anas crecca*) dans la région de Madrid et dans le sud du pays (source : Commission européenne ADIS le 29/08/2022).

Finlande

Le premier cas sauvage de la saison a été détecté le 08/08/2022 dans le sud du pays chez un pygargue à queue blanche (*Haliaeetus albicilla*) (source : Commission européenne ADIS le 29/08/2022). Deux nouveaux cas ont été détectés le 12/08/2022 sur un grand Cormoran (*Phalacrocorax carbo*) et le 16/08/2022 sur un Eider à duvet (*Somateria mollissima*) (source : Commission européenne ADIS le 05/09/2022).

France

Seules les données ADIS sont utilisées dans cette partie (incluant les cas et foyers notifiés jusqu'au 11/09/2022 23h59).

Un total de quatre foyers en élevages de volailles a été détecté depuis le début de la saison. Le premier l'a été dans le Morbihan au sein d'un élevage de dindes en engraissement. Deux autres ont été détectés à Ménéac dans le Morbihan le 22/08/2022 au sein d'élevages de canard en engraissement de 43 000 oiseaux et à Saint-Nizier-le-désert dans l'Ain le 24/08/2022 au sein d'un élevage de 10 600 canards. Un foyer a été détecté en Ile-et-Vilaine, dans le secteur de Rennes, le 28/08/2022 dans un élevage de 4 500 poules pondeuses (source : Commission européenne ADIS le 05/09/2022).

Un foyer en avifaune captive a également été détecté le 22/08/2022 à Saint-Onen-la-chapelle en Ile-et-Vilaine au sein d'une basse-cour. Deux foyers épidémiologique liés ont été détectés dans le département de la Somme chez des détenteurs de canards appelants possédant également des basses-cours : un foyer primaire de 70 canards (hébergeant également oies, pigeons et poules de Pékin) détecté le 20/08/2022 à Heilly, et un foyer secondaire de 30 canards (plus des pigeons, poules et dindon) détecté le 19/08/2022 à Le Titre (source : Commission européenne ADIS le 05/09/2022).

Foyer IAHP H5N1 dans la Meuse

Un foyer a été confirmé le 09/09/2022 dans la commune de Bislée dans un élevage de 70 000 poules pondeuses plein-air à proximité de la zone à risque particulier de la Woivre. Une forte mortalité dans la faune sauvage avait été observée à partir de novembre 2021 (Source : DGAL le 12/09/2022).

Cette semaine, 29 événements ont été notifiés, portant sur des événements détectés entre le 07/08 et 03/09/2022 dans l'Ain, la Charente-Maritime, le Finistère, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Manche et la Seine-Maritime, tous H5N1 (source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022).

Sur les deux dernières semaines, quinze cas sauvages ont été détectés (période du 29/08 au 11/09/2022) par le réseau Sagir et ont été notifiés :

- **Ain** : une oie cendrée (*Anser anser*), un cygne tuberculé (*Cygnus olor*) et un héron cendré (*Ardea cinerea*), trouvés morts le 03/09/2022 dans la zone réglementée du foyer de volaille, qui avait été détecté le 24/08/2022,
- Sur le littoral, du nord au sud :
 - o **Seine-Maritime** : un cas sur un fou de Bassan (*Morus bassanus*) détecté le 30/08/2022.



- **Manche** : trois nouveaux cas sur des fous de Bassan (*Morus bassanus*) détectés le 22/08/2022
- **Finistère** : trois cas détectés entre le 23 et 29/08/2022 sur des fous de Bassan (*Morus bassanus*),
- **Loire-Atlantique** : quatre nouveaux cas sur des goélands argentés (*Larus argentatus*) détectés entre le 23/08 et 03/09/2022 ;
- **Maine-et-Loire** : un cygne tuberculé (*Cygnus olor*) détecté le 29/08/2022.

L'incidence mensuelle glissante des cas sauvages est de 35 cas détectés sur les quatre dernières semaines, soit 15 détections de plus par rapport à la période précédente (période du 08/08 au 04/09/2022) (source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022). Elle demeure élevée depuis le mois de mai au regard de ce qui est habituellement observé à cette période. Bien que les fous de Bassan et divers laridés soient les principales espèces atteintes, on observe aussi des cas chez d'autres espèces d'ardéidés et d'anatidés, dont les canards colvert et les oies.

La situation est exceptionnelle (encore jamais rencontrée en France) de par son ampleur et la période où les détections ont cours. La circulation du virus IAHP H5N1 persiste au cours de ce qui constituait jusqu'à présent une intersaison pour l'activité IAHP en France. Elle concerne majoritairement des espèces d'oiseaux effectuant leur reproduction en colonies (goélands argentés et fous de Bassan). Cette période de nidification et d'élevage des juvéniles - qui se termine actuellement - pourrait avoir favorisé la transmission du virus. Bien que le niveau de risque soit revenu réglementairement au niveau négligeable (voir ci-dessous), la contamination de l'environnement reste élevée dans les régions où sont observées les mortalités d'oiseaux sauvages. La diffusion de cette contamination (et le risque d'introduction du virus dans les élevages de volailles) peut survenir à la faveur de mouvements de décantonement de populations d'oiseaux sauvages, toujours possibles y compris en dehors des périodes de mouvements migratoires.

Le 08/06/2022, face à l'amélioration de la situation sanitaire, le niveau de risque sur l'intégralité du territoire national a été abaissé à « négligeable », signifiant la levée des mesures sanitaires renforcées (dont la mise à l'abri des oiseaux d'élevage, les restrictions de mouvements et les interdictions de rassemblements de volailles) sur l'intégralité du territoire. Toutefois, dans les zones dites réglementées des mesures de lutte sont toujours en cours d'exécution (source : [MASA le 08/06/2022](#)).

Face aux mortalités groupées observées dans l'avifaune sauvage sur le littoral nord de la France, et afin d'éviter toute recrudescence de foyers au sein du compartiment domestique, le ministère appelle à une **vigilance renforcée en matière de biosécurité et de détection clinique** de tous les acteurs, professionnels ou particuliers, et à **limiter au maximum les déplacements des animaux au sein des départements touchés** (source : communication du MASA aux professionnels le 30/06/2022). Le 05/08/2022, une instruction (IT 2022-605) a été envoyée aux départements du littoral de la Manche afin de sensibiliser les acteurs, renforcer les mesures de prévention pour les élevages avicoles, renforcer la surveillance événementielle et mettre en place, dans le cadre d'autocontrôles, une surveillance programmée dans les élevages avicoles. L'utilisation des appelants est également régulée. Suite à la détection du nouveau foyer dans le Morbihan, le Ministère en charge de l'Agriculture a appelé une nouvelle fois les professionnels et les particuliers (y compris les acteurs de la faune sauvage) à maintenir leur niveau de vigilance en matière de biosécurité et de détection clinique précoce. Lors de cette communication, il a rappelé les mesures mises en place suite à la publication de l'instruction technique susmentionnée (source : communication du MASA aux professionnels le 19/08/2022).

Les détections dans l'Ain, la Meuse et sur les façades de la Manche et l'Atlantique confirment la nécessité d'un appel à la vigilance des professionnels et des particuliers sur l'ensemble du territoire national afin d'assurer la détection la plus précoce des foyers et des cas.





Figure 4. Localisation des foyers de « volailles », cas chez les oiseaux captifs et cas sauvages détectés en France sur les quatre dernières semaines et sur la semaine précédant le 11/09/2022. Les définitions de compartiment sont celles du Règlement 2016/429. Les ZRP et ZRD sont représentées respectivement en violet et jaune sur le fond de carte (source : DGAL, Commission européenne ADIS le 12/09/2022).

Pays-Bas

Le premier foyer de la saison 2022/23 a été détecté les 01/08/2022 dans la province Overijssel à l'est du pays au sein d'un élevage de 104 887 volailles. Treize foyers de volailles ont été détectés depuis le début de la saison au sein d'élevages de diverses espèces (canards, poules pondeuses, poulets de chair). Trois foyers de volailles (le 01/09/2022) et trois foyers dans des élevages de faisans (entre le 22 et 31/08/2022) ont été détectés dans la moitié nord du pays (Source : Commission européenne ADIS au 05/09/2022). **Un foyer supplémentaire en élevage de faisans a été détecté le 31/08/2022 dans le nord du pays (source : Commission européenne ADIS au 12/09/2022).**

Dix cas sauvages ont été détectés entre le 18 et 24/08/2022, impliquant diverses espèces : oie cendrée (*Anser anser*), fou de Bassan (*Morus basanus*), canard colvert (*Anas platyrhynchos*), cygne tuberculé (*Cygnus olor*), goéland argenté (*Larus argentatus*) et Chevalier cul-blanc (*Tringa ochropus*) (source : Commission européenne ADIS le 05/09/2022). Huit nouvelles notifications ont concerné des oies (bernache du Canada-*Branta canadensis* et oie cendrée-*Anser-anser*) détectées le 23 et 29/08/2022 dans plusieurs régions du pays (Nord Hollande, Gueldre, lac de l'Yssel) (source : Commission européenne ADIS au 12/09/2022).




Portugal

Un foyer a été détecté au sein d’une basse-cour de la région de Beja (Source : Commission européenne ADIS au 22/08/2022). Deux nouveaux foyers ont été détectés dans des élevages de canards en engraissement le 29/08/2022 à Évora et le 01/09/2022 à Santarém dans le secteur de Lisbonne (source : Commission européenne ADIS le 05/09/2022). Plus au sud, à Beja, plusieurs cas ont été détectés sur des canards et oies domestiques dans un parc urbain : une notification concerne des oiseaux captifs et une notification concerne des oiseaux sauvages libres (source : Commission européenne ADIS le 05/09/2022).

Tableau 1. Fréquence des espèces sauvages identifiées dans les déclarations ADIS sur l’avifaune sauvage libre en Europe depuis le 01/08/2022. **ATTENTION** : plusieurs cas impliquant éventuellement des individus d’espèces différentes peuvent figurer dans une même déclaration ; dans ce cas, la déclaration est comptabilisée plusieurs fois dans ce tableau (une fois pour chaque espèce touchée). En revanche, le nombre de déclarations ne reflète pas le nombre de spécimens pour chaque espèce (Source : Commission européenne ADIS au 12/09/2022).

| Espèce | Nom latin | Nombre de déclaration-espèce |
|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| Fou de bassan (sulidé) | <i>Morus bassanus</i> | 56 |
| Goéland argenté | <i>Larus argentatus</i> | 24 |
| Oie cendrée | <i>Anser anser</i> | 20 |
| Cygne tuberculé | <i>Cygnus olor</i> | 15 |
| Sulidé (non identifiée) | <i>Sulidae (incognita)</i> | 10 |
| Canard colvert | <i>Anas platyrhynchos</i> | 9 |
| Bernache du Canada | <i>Branta canadensis</i> | 6 |
| Grand Cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | 2 |
| Mouette Rieuse | <i>Chroicocephalus ridibundus</i> | 2 |
| Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | 2 |
| Bernache nonnette | <i>Branta leucopsis</i> | 2 |
| Pygargue à queue blanche | <i>Haliaeetus albicilla</i> | 2 |
| Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | 1 |
| Eider à duvet | <i>Somateria mollissima</i> | 1 |
| Fuligule morillon | <i>Aythya fuligula</i> | 1 |
| Fuligule nyroca | <i>Aythya nyroca</i> | 1 |
| Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | 1 |
| Tadorne de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | 1 |
| Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | 1 |
| Grand Corbeau | <i>Corvus corax</i> | 1 |
| Faisan commun | <i>Phasianus colchicus</i> | 1 |
| Mouette à tête grise | <i>Chroicocephalus cirrocephalus</i> | 1 |
| Grèbe castagneux | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | 1 |
| Héron cendré | <i>Ardea cinerea</i> | 1 |
| Chevalier cul-blanc | <i>Tringa ochropus</i> | 1 |
| Anserinae (non identifiée) | <i>Anserinae (unidentified)</i> | 1 |
| Guillemot à miroir | <i>Cephus grylle</i> | 1 |
| Autour des Palombes | <i>Accipiter gentilis</i> | 1 |
| Buse variable | <i>Buteo buteo</i> | 1 |
| Épervier d'Europe | <i>Accipiter nisus</i> | 1 |
| Faucon lanier | <i>Falco biarmicus</i> | 1 |
| Faucon pèlerin | <i>Falco peregrinus</i> | 1 |



Royaume-Uni


Depuis le début de la saison, onze foyers volailles, quatre foyers captifs et six cas sauvages ont été notifiés. Un rapport d'analyse de risque souligne la persistance du virus dans le compartiment sauvage pendant les mois de juillet et août 2022 (source : WAHIS-OMSA consulté le 12/09/2022, [DEFRA le 01/09/2022](#)).

Russie

Six cas sauvages ont été détectés dans l'ouest du pays entre le 02 et le 07/08/2022 (source : WAHIS-OMSA le 22/08/2022). Un nouveau foyer de H5N1 a été détecté le 15/08/2022 et notifié le 09/09/2022 dans une exploitation de 8 000 volailles (production non précisée) à Dergachi-Ptitsa au nord du Kazakhstan (source : WAHIS-OMSA le 09/09/2022)

Tableau 2. Nombre de foyers de volailles et cas « autres que volailles » d'IAHP H5 détectés en Europe depuis le début de la saison 2022-2023 (soit le 01/08/2022), sur les quatre dernières semaines précédant la publication de ce BHVSI-SA par pays (par ordre alphabétique). Les définitions de compartiment sont celles du Règlement 2016/429 (cf. encadré supra) L'incidence mensuelle couvre la période du 15/08/2022 au 11/09/2022 (source : Commission européenne ADIS et WAHIS-OMSA le 12/09/2022).

| Pays | Compartiment | Date de première suspicion de la saison | Nombre de foyers et cas pour la saison 2022-2023 | H5N1 | H5Nx | Incidence mensuelle |
|-----------|--------------|---|--|------|------|---------------------|
| Allemagne | Sauvages | 04/08/2022 | 10 | 10 | 0 | 1 |
| | Volailles | 02/08/2022 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| Belgique | Sauvages | 05/08/2022 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| Danemark | Sauvages | 13/08/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Espagne | Sauvages | 02/08/2022 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| | Volailles | 01/08/2022 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| Finlande | Sauvages | 08/08/2022 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| France | Captifs | 19/08/2022 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | Sauvages | 01/08/2022 | 65 | 65 | 0 | 35 |
| | Volailles | 16/08/2022 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| Irlande | Sauvages | 01/08/2022 | 13 | 13 | 0 | 9 |
| Moldavie | Volailles | 06/08/2022 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Norvège | Sauvages | 04/08/2022 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| Pays-Bas | Captifs | 09/08/2022 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| | Sauvages | 01/08/2022 | 38 | 38 | 0 | 23 |
| | Volailles | 01/08/2022 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| Portugal | Captifs | 10/08/2022 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| | Sauvages | 29/08/2022 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | Volailles | 29/08/2022 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | Captifs | 08/08/2022 | 4 | 4 | 0 | 2 |



| | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|------------|------------|----------|-----------|
| Royaume-Uni* | Sauvages | 09/08/2022 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| | Volailles | 01/08/2022 | 11 | 11 | 0 | 7 |
| Russie* | Captifs | 02/08/2022 | 8 | 8 | 0 | 1 |
| | Volailles | 15/08/2022 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Europe | Captifs | 02/08/2022 | 26 | 26 | 0 | 14 |
| | Sauvages | 01/08/2022 | 159 | 158 | 1 | 85 |
| | Volailles | 01/08/2022 | 40 | 40 | 0 | 30 |

*source : WAHIS-OMSA consulté le 12/09/2022 . Seuls les foyers et cas situés en Europe géographique (à l'ouest du 60ème degré de longitude) sont indiqués.

Cas chez les mammifères

Un premier cas a été détecté sur un grand dauphin (*Tursiops truncatus*) trouvé mort en Floride en mars 2022. Le diagnostic d'infection par le virus influenza a été réalisé en seconde intention, après la réalisation des épreuves diagnostiques de routine chez cette espèce et élimination des causes de mortalités habituelles. Des symptômes d'encéphalite ont été observés. Le virus appartenait au clade 2.3.4.4b de la lignée virale eurasiennne H5 (source : université de Floride [UFHealth](#), le 07/09/2022).

Pour en savoir plus

- Un article rédigé par l'OFB intitulé « la migration des anatidés : patron général, évolutions, et conséquences épidémiologiques » est disponible [sur le site internet du bulletin épidémiologique Anses DGAL](#).

^[1]François-Xavier Briand, Béatrice Grasland, Sophie Le Bouquin-Leneveu, Éric Niqueux, Axelle Scoizec, Audrey Schmitz

POURSUITE DES DETECTIONS EN ITALIE ET EN ALLEMAGNE

Les essentiels

- **Allemagne** : pas d'évolution de la situation épidémiologique cette semaine.
- **Italie** : situation stable dans le Latium et le Piémont depuis un mois, pas de nouvelle déclaration cette semaine.
- **France métropolitaine** : le territoire est indemne, aucun cas n'a été déclaré au 11/09/2022 (source : DGAL).

EUROPE. Bilan hebdomadaire européen du 01/01/2022 au 11/09/2022 inclus (source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022)

L'incidence mensuelle glissante est de 179 cas dans la faune sauvage^[1] (-14 par rapport à la semaine précédente) et 56 foyers domestiques (-12 par rapport à la semaine précédente) détectés sur les quatre dernières semaines (Tableau 1). L'évolution de l'incidence quotidienne en moyenne glissante sur sept jours des cas sauvages et des foyers domestiques est présentée en Figure 1.

La densité des foyers domestiques et cas en faune sauvage en Europe est représentée sur la Figure 2.

[1] A noter que certains pays font des déclarations uniques de cas multiples dans la faune sauvage, alors que d'autres ne déclarent que des cas individuels. Sont dénombrées ici les notifications.



Figure 1. Nombre quotidien moyen de foyers et de cas détectés glissant sur sept jours dans les compartiments **domestique** (-) et **sauvage** (-) en Europe entre le 01/01 et le 04/09/2022 (source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022). NB : les données des dernières semaines sont à interpréter avec précaution, compte tenu des délais entre suspicion/détection, confirmation et notification. Elles peuvent être incomplètes.



Tableau 1. Nombre de foyers domestiques et cas en faune sauvage non captive de PPA détectés depuis le 01/01/2022. L'incidence mensuelle couvre la période du 15/08 au 11/09/2022 (source: Commission Européenne ADIS et OIE le 12/09/2022).

| Pays | Compartiment | Nombre de foyers et cas depuis le 01/01/2022 | Incidence mensuelle |
|-----------------------|-------------------|--|---------------------|
| Allemagne | Domestique | 3 | 0 |
| | Sauvage | 1 148 | 20 |
| Bulgarie | Domestique | 2 | 0 |
| | Sauvage | 129 | 0 |
| Estonie | Sauvage | 30 | 1 |
| Hongrie | Sauvage | 458 | 9 |
| Italie (Continentale) | Domestique | 1 | 0 |
| | Sauvage | 229 | 2 |
| Italie (Sardaigne) | Domestique | 2 | 0 |
| | Sauvage | 4 | 0 |
| Lettonie | Domestique | 6 | 1 |
| | Sauvage | 545 | 68 |
| Lituanie | Domestique | 14 | 8 |
| | Sauvage | 185 | 23 |
| Macédoine du Nord | Domestique | 17 | 6 |
| | Sauvage | 4 | 0 |
| Moldavie | Domestique | 10 | 1 |
| | Sauvage | 3 | 0 |
| Pologne | Domestique | 14 | 1 |
| | Sauvage | 1 282 | 34 |
| Roumanie | Domestique | 214 | 23 |
| | Sauvage | 318 | 6 |
| Russie* | Domestique | 50 | 10 |
| | Sauvage | 37 | 2 |
| Serbie | Domestique | 77 | 5 |
| | Sauvage | 89 | 0 |
| Slovaquie | Domestique | 5 | 0 |
| | Sauvage | 437 | 14 |
| Ukraine | Domestique | 5 | 1 |
| | Sauvage | 2 | 0 |
| Europe | Domestique | 420 | 56 |
| | Sauvage | 4 900 | 179 |

*Pour la Russie, seuls les foyers et cas situés en Europe géographique (à l'ouest du 60^{ème} degré de longitude) sont indiqués




Figure 2. Densité des foyers domestiques (haut) et des cas en faune sauvage (bas) de PPA en Europe ayant été détectés entre le 01/01 et le 11/09/2022 (source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022). Les carrés noirs correspondent aux zooms réalisés pour les figures 5 et 7.

Une carte interactive des foyers domestiques et cas en faune sauvage est disponible sur le site de la Plateforme ESA ([lien](#)). Elle permet de générer des cartes et séries temporelles représentant l'évolution spatiale et temporelle des foyers, selon les périodes et zones géographiques d'intérêt.

Mesures de zonage de l'UE : sur la base de la situation épidémiologique relative à la PPA dans les pays membres de l'UE, des zones de restriction I, II et III sont réglementées et énumérées à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2021/605 de la Commission en dernier lieu modifié par le règlement d'exécution (UE) 2021/1714 de la Commission du 24/09/2021.

La carte résumant les mesures de zonage en Europe (Figure 3) et un outil interactif (lien) pour les mesures de zonage fournissent une représentation indicative de ces zones.




Figure 3. Représentation des zones réglementées vis-à-vis de la peste porcine africaine dans l'Union européenne au 02/09/2022 (annexe du règlement 2021/605) (Source : [site de la Commission européenne](#)). Les parties sont ventilées par degré de risque en tenant compte de la situation épidémiologique et, notamment, des facteurs suivants : la maladie touche *a minima* les exploitations porcines plus ou moins la population de porcs sauvages (zone III) ; la maladie ne touche que la population de porcs sauvages (zone II) ; le risque découle d'une proximité relative avec la population de porcs sauvages contaminée (zone I) (annexe du règlement d'exécution 2021/605 modifié par la [décision d'exécution 2022/1460/UE](#) du 02/09/2022).



Allemagne

La distribution géographique des cas et foyers détectés en Allemagne et dans l'ouest de la Pologne est représentée dans la figure 5. Depuis le 10/09/2020, date de la première détection de la PPA dans la faune sauvage en Allemagne, les autorités ont défini **du point de vue réglementaire trois types de zone** : zone cœur, zone à risque et zone tampon.

Compartiment sauvage

Le nombre de cas notifiés en Allemagne par semaine couverte par le BHVSI-SA est représenté dans la figure 4. Depuis le 10/09/2020, la progression de la PPA en Allemagne vers l'ouest se fait de deux façons, limitée de façon naturelle en « tâche d'huile » au sein de la population de sangliers, et par sauts d'est en ouest de plusieurs centaines de kilomètres au sein du compartiment sauvage ou vers le compartiment domestique probablement liés à l'activité humaine.

Depuis le début de l'année 2022, le nombre de détections dans l'est du pays, à la frontière germano-polonaise, est de 1 151 cas (+16 par rapport à la semaine précédente). Les cas ont été détectés dans les Länder de Brandebourg (n=299, +10), Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (n=37) et Saxe (n=812, +6) (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022). Du nord au sud, le front s'étend sur une distance totale de 218 km. Les cas dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale les plus éloignés à l'ouest sont à 160 km de la frontière germano-polonaise. A titre de comparaison, la distance entre les deux extrémités de la zone infectée en Belgique mesurait à son maximum 36 km en 2019. Depuis la détection de la PPA en Allemagne le 09/09/2020, 4 101 cas ont été détectés chez des sangliers (source : Commission Européenne ADIS le 05/09/2022).

- **Land du Brandebourg**

La PPA a été confirmée la première fois dans ce Land le 10/09/2020 dans la circonscription de Spree-Neiße. Depuis elle s'est propagée vers l'ouest. Le 30/09/2020 un cas a été confirmé dans la circonscription de Märkisch Oderland, approximativement à 64 km au nord des cas détectés dans les circonscriptions de Oder-Spree et Spree-Neiße. Le 04/03/2021, des cas ont été confirmés autour de la ville de Frankfurt /Oder située entre les circonscriptions de Spree-Neiße et Märkisch-Oderland. Plus au nord, les circonscriptions de Barnim et Uckermark ont identifié leurs premiers cas début août 2021 à quelques kilomètres de la frontière germano-polonaise (source : Commission Européenne le 16/08/2021). Les cas les plus au nord ont été trouvés dans la commune de Schwedt à 17 km du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale.

Sur les quatre dernières semaines, quinze cas sauvages ont été détectés, dans le Spree-Neiße (n=13) et l'Uckermark (n=2) (source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022). Dans le Spree-Neiße, un cas a été détecté le 23/06/2022 à 400 m en dehors de la zone blanche, sur la commune de Peitz, village de Bärenklau (source : Commission européenne ADIS le 04/07/2022). Le périmètre réglementé Nord a évolué en fonction, avec la construction prévue d'une clôture de 20 km (source : communiqué de presse le 01/07/2022, media le 28/06/2022).

- **Land du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale**

Les trois premiers cas avaient été détectés chez des sangliers lors d'une même chasse le 24/11/2021 (source : Commission européenne ADIS au 29/11/2021 et information média NDR du 27/11/2021). Ces cas se situent à plus de 60 km au sud-ouest du foyer en élevage situé près de Rostock dans le même land et à 160 km de la frontière germano-polonaise. La zone réglementée mise en place est à cheval sur le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale et le Brandebourg.

Deux nouveaux cas sauvages ont été détectés ces quatre dernières semaines, tous dans la circonscription du Ludwigslust-Parchim (source : Commission européenne ADIS le 05/09/2022).

- **Land de Saxe**

Le premier cas avait été détecté le 13/10/2021 dans le cadre d'une surveillance programmée, le sang de chaque animal tiré étant prélevé par les chasseurs.

Sur les quatre dernières semaines trois cas sauvages ont été détectés, tous situés dans le districts de Bautzen (n=2) (Source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022). Un cas sauvage avait été détecté en bordure de zone tampon le 23/06/2022 à Königswartha, Bautzen (source : Commission européenne ADIS le 11/07/2022). Suite à cette augmentation des cas en zones infectées, le périmètre de surveillance réglementée a été actualisé en date du 04/07/2022, pour les circonscriptions de Bautzen, commune de Dresde, circonscription de Meissen, et de Mittelsachsen, passant du statut de zone « tampon » (zone I : le risque découle d'une proximité relative avec la population de porcins sauvages contaminée) à zone « menacée » (zone II : la maladie touche population de porcins sauvages du règlement 2021/605). La zone II est donc à présent continue d'Est en Ouest depuis la frontière avec la Pologne, jusqu'à Dresde (source : autorités sanitaires de Saxe le 04/07/2022). Les zones réglementées européennes ont été actualisées dans ce sens le 11/07/2022 (figure 3).

Compartment domestique

• Land du Bade-Wurtemberg

Un foyer de peste porcine africaine a été détecté le 25/05/2022 dans le Bade-Wurtemberg, à plus de 500 km des cas sauvages de Saxe et du Brandebourg et à 6,5 km de la frontière française (détail du foyer dans le [BHVS du 12/07/2022](#)). Aucun nouveau foyer depuis celui du 25/05/2022 n'a été détecté dans le land au 11/09/2022 (Source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022). Les mesures de lutte ont été levées le 25/08/2022 (source : autorités du Bade-Wurtemberg).

• Land du Brandebourg

Un foyer domestique a été détecté le 01/07/2022 dans l'arrondissement d'Uckermark sur la commune de Prenzlau dans un élevage de 1 300 porcs. Ce foyer est situé à environ 50 km au nord-ouest du cas sauvage le plus proche (détecté le 17/06/2022 à Schwedt/Oder) (source : Commission européenne ADIS le 04/07/2022). Les zones réglementées ont été actualisées dans ce sens le 11/07/2022 (source : autorités sanitaires du Brandebourg le 14/07/2022, figure 3). En date du 11/09/2022, aucun autre foyer n'a été détecté dans le land (source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022).

• Land de Basse-Saxe

Un foyer domestique a été détecté le 01/07/2022 sur la commune de Emsbüren, à une dizaine de kilomètres de la frontière avec les Pays-Bas (détail du foyer dans le [BHVS du 12/07/2022](#)). En date du 11/09/2022, aucun autre foyer n'a été détecté dans le land (source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022).




Figure 4. Incidence hebdomadaire des cas en faune sauvage de PPA en Allemagne ayant été détectés entre le 01/01/2022 et le 11/09/2022. Les courbes noire, bleue, verte et orange matérialisent, respectivement, le nombre de cas sur l'ensemble de l'Allemagne, et au sein des länder de Brandebourg, de Saxe et du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale (source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022). NB : les deux dernières semaines sont à interpréter avec précaution, compte tenu des délais entre suspicion/détection, confirmation et notification. Elles peuvent être incomplètes.




Figure 5. Localisation des cas et foyers de PPA ayant été détectés en Allemagne et dans l’ouest de la Pologne entre le 01/01/2022 et le 11/09/2022 à gauche, et au cours des quatre dernières semaines (08/08 au 04/09/2022) à droite (source :Commission européenne ADIS au 22/09/2022).

France

La France métropolitaine est indemne de PPA, aucun cas n’a été déclaré au 11/09/2022 (source : DGAL le 12/09/2022). Une instruction technique, publiée par la DGAL le 03/06/2022, a actualisé les niveaux de surveillance de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique dans la faune sauvage : passage au niveau 2B pour quatorze communes du Bas-Rhin (67) (source : BO [instruction officielle](#)). Les départements frontaliers de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur (Alpes maritimes, Alpes de Haute Provence et Hautes-Alpes) étaient déjà au niveau 2B depuis le 21/01/2022. Pour rappel, les niveaux de surveillance des pestes porcines dans la faune sauvage sont définis par l’instruction 2018-938 (<https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-938>).

Durant les saisons de chasse (semaine 27 de l’année n-1 à semaine 26 de l’année n) 2020/21 et 2021/22, 114 et 65 cadavres de sangliers ont été respectivement signalés sur l’ensemble du territoire métropolitain dont 65 et 49 ont été prélevés et testés par le réseau Sagir (source : [note Plateforme ESA du 12/01/2022](#)). Tous étaient négatifs pour la PPA. Le nombre de cadavres est en nette diminution par rapport aux années 2019 et 2020. Le réseau, qui avait naturellement élevé son niveau de sensibilité depuis septembre 2018 par rapport aux événements de mortalité, revient donc à une situation d’avant la crise en ne collectant les cadavres que lors d’une mortalité jugée anormale (source : [réseau Sagir au 16/05/2021](#)). Afin de sensibiliser les voyageurs, les éleveurs et les chasseurs aux mesures de précaution à respecter pour ne pas introduire ou véhiculer le virus de la PPA en France, le ministère en charge de l’agriculture a lancé une campagne de communication ([campagne de communication "Peste Porcine Africaine" 2020](#)).

Sensibilisation de la filière par la DGAL

Suite à l’arrivée de la PPA de génotype II dans le Piémont et la Ligurie en Italie, des messages de sensibilisation ont été adressés aux acteurs impliqués dans la surveillance de la PPA en France par la DGAL. Les services de l’Etat et les différentes organisations professionnelles sont mobilisées pour redoubler de vigilance et augmenter la surveillance notamment chez le sanglier, la surveillance événementielle étant une modalité indispensable pour une détection précoce de toute introduction ([lien DGAL](#)).

Un nouveau message de sensibilisation a été adressé le 27/05/2022 aux acteurs impliqués dans la surveillance de la PPA en France ainsi qu’aux voyageurs par la DGAL suite à la découverte d’un foyer en Allemagne à 6 km de la frontière française ([lien](#)).

Italie

Un premier cas de PPA a été détecté le 05/01/2022 en Italie continentale dans le Piémont. Comme pour les souches du reste de l'Europe (hors Sardaigne), la souche isolée dans le Piémont appartient au génotype II excluant une contamination venant de Sardaigne où la PPA de génotype I est présente. Le cas le plus proche (hors Sardaigne) en Europe a été confirmé en Hongrie à 592 km de distance. La PPA est considérée comme enzootique en Sardaigne qui est infectée par le génotype I depuis 1978. Le suivi des déclarations de PPA dans l'Italie continentale est disponible sur le site internet des « [Istituto Zooprofilattico Sperimentale](#) » ([IZS - Instituts zooprophyllactiques expérimentaux](#)) [régionaux](#) (Source : [Actualisation quotidienne par l'IZS Piémont, Ligurie Val d'Aoste, IZS région du Latium](#)). Des informations détaillées ont été présentées le 11/05/2022 par les autorités sanitaires italiennes (source : CPVADAAA du 11/05/2022).

D'après les analyses génétiques réalisées par l'IZS Teramo, les souches isolées en Italie du Nord (Piémont et Ligurie) et en Italie centrale (Latium) ne sont pas liées l'une à l'autre. Elles seraient dues à des introductions du virus à partir de sources différentes (source : lien izs).

- **Latium**

Compartiment sauvage

Au total au 11/09, depuis le premier cas détecté le 04/05/2022, 48 cas ont été détectés dans le Latium (aucun nouveau cas notifié cette semaine). Le précédent cas avait été détecté le 11/08/2022 à Rome (source : Commission européenne ADIS au 12/08/2022). La figure 6 présente la localisation des cas dans la région de Rome. Le premier cas avait été suspecté le 04/05/2022 dans la réserve naturelle de l'Insugherata, au nord-ouest de Rome (détail du cas dans le [BHVS du 12/07/2022](#)). La souche a été caractérisée de génotype II, excluant l'hypothèse d'introduction du virus depuis la Sardaigne (génotype I). Un cas unique avait également été détecté le 26/05/2022 à 65 km au nord-est, à proximité de Rieti (source : Commission européenne ADIS au 27/06/2022).

Compartiment domestique

Un premier et unique foyer domestique (figure 6) a été observé le 09/06/2022 au sein d'une basse-cour détenant neuf porcs située dans la réserve d'Insugherata (source : Commission européenne ADIS au 20/06/2022).

Casi notificati all'UE di Peste Suina Africana nel Lazio - 07/09/2022

- Cinghiali infetti [0 nuovi, 48 totali]
- Nuovi casi nel selvatico
- ▲ Focolai suino domestico [1]
- Zona infetta
- Zona confinante con la zona infetta




Figure 6. Localisation des cas, de la zone infectée et de la zone de vigilance vis-à-vis de la PPA dans la région du Latium au 07/09/2022 (Source : [IZS Umbrie et Marche LNR PPA le 07/09/2022](#)). Les points rouges correspondent aux **cas sauvages**, les points bleus aux **nouveaux cas sauvages**, les triangles jaunes aux **foyers domestiques**, les zones orangées aux zones infectées et les zones jaunes aux zones de surveillance.

- **Piémont / Ligurie**

Un premier cas de PPA chez un sanglier a été détecté le 05/01/2022 sur la commune d'Ovada dans le Piémont et confirmé par PCR le 06/01/2022. La souche a été caractérisée de génotype II. Le cas se situait à proximité d'une autoroute (E25) et à moins de 100 km de la frontière avec la France (source : Commission européenne ADIS

le 07/01/2022). Les mesures immédiates prises pour contrôler ces cas sont détaillées dans le [BHVS du 12/07/2022](#) (sources : [circulaire ministérielle du 18/01/2022](#) et [Région du Piémont le 15/03/2022](#)).

Au total, au 11/09/2022, 181 cas de sangliers ont été déclarés en Ligurie (n=63) et dans le Piémont (n=118) (pas de nouveau cas par rapport à la semaine précédente) (Figure 8), le dernier en date du 23/08/2022.

Au 11/09/2022, la commune de Ponzone reste la commune infectée la plus occidentale avec un total de quatre cas identifiés (source : Commission européenne ADIS au 12/09/2022) (Figure 8). Ce quatrième cas est situé à 500 m à l'ouest du 2^{ème} rideau et à 3,3 km de la limite de la zone infectée (zone II UE). Le second rideau de clôtures a donc été franchi. Un repositionnement des clôtures est en cours de planification par les autorités du Piémont (source : communication DRAAF PACA) (source : Commission européenne ADIS au 14/08/2022).

A ce jour, la PPA est à 76 km de la frontière française.




Figure 7. Cas et foyers de PPA génotype II en Italie continentale entre le 05/01 et le 11/09/2022 au-dessous, et au cours des quatre dernières semaines (15/08 au 11/09/2022) au-dessus (source : Commission européenne ADIS au 12/09/2022).

Piémont et Ligurie : sangliers prélevés pour recherche PPA du 27/12/2021 au 25/08/2022




Figure 8. Distribution des cas de PPA détectés sur des sangliers en Ligurie et dans le Piémont entre le 27/12/2021 et le 25/08/2022 (Source : Actualisation par l'IZS Piémont)




Figure 9. Incidence hebdomadaire des cas en faune sauvage de PPA en Italie ayant été détectés entre le 01/01/2022 et le 11/09/2022. Les courbes noire pointillée, bleue et orange matérialisent, respectivement, le nombre de cas sur l'ensemble de l'Italie continentale (hors Sardaigne), et au sein des provinces du Latium, et de Piémont-Ligurie (source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022). NB : les dernières semaines sont à interpréter avec précaution, compte tenu des délais entre suspicion/détection, confirmation et notification. Elles peuvent être incomplètes.



• Sardaigne

Le dernier foyer (sérologique) de génotype I a été détecté le 24/05/2022 dans la commune de Nuoro chez un porc sauvage sans propriétaire (porc « féral »), portant à six le nombre de déclarations en 2022, dont quatre en élevages (source : Commission européenne ADIS au 07/06/2022).

En 2021, cinq cas sauvages de génotype I avaient été détectés entre le 05 et le 23/12/2021. Six cas avait déjà été détectés en novembre sur l'île. Tous ces cas ont été détectés par sérologie. Les cas antérieurs remontaient à janvier 2021 (pour un total de onze cas sauvages et douze foyers domestiques en 2021 en Sardaigne) (source : Commission Européenne ADIS le 10/01/2022).

Pays Baltes

On observe ces dernières semaines un maintien à un niveau élevé du nombre de cas et foyers déclarés par la Lituanie (23 cas sauvages et huit foyers domestiques ces quatre dernières semaines) et la Lettonie (78 cas sauvages et un foyer domestiques ces quatre dernières semaines) (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022).

Pologne

La Pologne a détecté 34 cas sauvages sur les quatre dernières semaines (contre 46 la semaine n-1). Les détections sont réparties sur tout le pays, d'est en ouest, de la frontière avec la Biélorussie à la frontière avec l'Allemagne. La majorité des cas est localisée sur la partie ouest (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022).

Trois foyers ont été détectés le 27/06/2022 en Grande Pologne et le 29/06 en Basse-Silésie (source : Commission Européenne ADIS le 27/06/2022). Un nouveau foyer a été détecté le 14/07/2022 en Poméranie-Occidentale à environ 10 km de la frontière avec l'Allemagne (land de Brandebourg) (figure 5) (source : Commission Européenne ADIS le 18/07/2022).

Roumanie

Les incidences mensuelles des cas et foyers restent relativement stables. Le pays a détecté six cas sauvages et 23 foyers domestiques sur les quatre dernières semaines (contre huit et 25 respectivement la semaine n-1), répartis sur tout le territoire (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022).

Slovaquie

Un foyer domestique a été détecté le 09/05/2022 dans un élevage domestique. Le dernier foyer détecté dans le pays avait été identifié dans cette même région en janvier 2022 (source : Commission Européenne ADIS le 23/05/2022).

L'incidence mensuelle des cas sauvages stagne à un niveau élevé avec 14 sangliers détectés sur les quatre dernières semaines (14 sur la période précédente) (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022).

Pour en savoir plus

- Les différentes actions de sensibilisation à la PPA menées en France sont disponibles sur le site de la Plateforme ESA ([lien](#)) et sur le site du ministère en charge l'agriculture ([lien](#)).
- Des informations sur la PPA sont disponibles sur le site de l'Anses ([lien](#)) et du ministère en charge de l'agriculture ([lien](#)).

Situation aux Caraïbes

En République Dominicaine, un premier cas de peste porcine africaine a été rapporté le 28/07/2021, identifié dans le cadre d'un programme de surveillance des maladies hémorragiques porcines mené par le laboratoire américain de diagnostic des maladies animales exotiques (Plum Island, New York) (Source : [Communiqué de l'USDA du 28/07/2021](#)). Les premières suspicions dataient du 01/07/2021 (Source : [Notification OIE du 29/07/2021](#)).

L'épizootie s'est répandue rapidement sur toute l'île d'Hispaniola. Le premier foyer en Haïti a été détecté le 26/08/2021 (source : OIE [notification immédiate le 20/09/2021](#)).

Compte-tenu des contextes socio-économique et politique de ces pays, le suivi sanitaire des foyers de PPA sur l'île d'Hispaniola est irrégulier.

Au 22/04/2022, on dénombre 1 242 foyers confirmés en République Dominicaine et 401 foyers confirmés en Haïti (source : [Conférence de l'IICA \(Institut interaméricain de coopération en agriculture\) du 28/04/2022](#) ([lien](#))).

La peste porcine classique (PPC) est enzootique en Haïti et en République dominicaine. La PPA n'avait plus été observée sur le continent américain depuis 1982, où elle était présente en Haïti.



En date du 12/09/2022, les Antilles françaises et Guyane sont officiellement indemnes de PPA (Source : DGAL au 12/09/2022).

Situation en Asie / Océanie

La PPA (génotype II) a été détectée pour la première fois sur le continent asiatique en août 2018 en Chine, et se propage depuis dans la région, touchant actuellement quinze pays en Asie. Des informations plus précises sur chacun des pays sont disponibles sur le site OIE-WAHIS ([lien](#)) et sur le site de l'OIE Asie/Pacifique ([lien](#)). Les dernières dates d'occurrence de foyers domestiques et de cas faune sauvage par pays sont disponibles dans un précédent bulletin ([lien](#)). Dans un article publié le 28/10/2021 ([lien](#)), les auteurs ont indiqué avoir détecté en juin 2021 des souches de PPA appartenant au génotype I dans les provinces de Hénan et Shandong en Chine. L'origine de ces souches n'a pas été déterminée ; l'analyse phylogénétique montre une grande similitude avec les souches isolées au Portugal en 1968 et 1988. Ces souches ayant une moindre pathogénicité, leur détection est plus difficile ce qui complexifie la lutte contre la maladie. **Pour des informations plus récentes, voir le site de l'OMSA Asie/Pacifique ([lien](#)) et la déclaration FAO du 01/09/2022 ([lien](#)).** A noter qu'en Europe depuis 2014, l'ensemble des cas déclarés (hors Sardaigne) appartenaient au génotype II (souche Georgia 2007).

PREMIERES DETECTIONS EN CROATIE

Les essentiels

- **Allemagne** : poursuite des détections chez les oiseaux et équidés, dont un premier cas (aviaire) dans le land de Saxe.
- **Croatie** : premières détections de la saison (deux foyers équins).
- **Italie** : six foyers équins et cas dans l'avifaune détectés sur les quatre dernières semaines.

Fiche rédigée en Collaboration avec le Laboratoire de santé animale de l'Anses⁵ (LNR et laboratoire UE de référence), Santé Publique France⁶ et le Cirad⁷

Les deux premiers cas d'infection par le virus West Nile de la saison ont été détectés en Italie, dans la région de Vénétie, le 10/06/2022 sur une corneille noire (*Corvus corone*) et le 30/06/2022 sur un grand corbeau (*C. corax*) (Figure 1). Le total du nombre de cas et foyers dans l'avifaune, chez les équidés et chez les humains est présenté dans le tableau 1.




Figure 1 : Cas d'infection par le virus West Nile chez les animaux et les Humains détectés depuis le 01/06/2022. Les coordonnées géographiques des cas humains représentés correspondent aux centroïdes des régions administratives NUT3 pour les pays UE ([nomenclature UE](#)) et GAUL1 pour les autres pays ([nomenclature FAO](#)) dans lesquels ils ont été détectés. Plusieurs cas humains peuvent avoir été détectés dans la même région administrative (source : Commission Européenne ADIS, [IZS](#) et ECDC le 12/09/2022).

⁵ Gaëlle Gonzalez, Nolwenn Dheilley, Stephan Zientara

⁶ Marie-Claire Paty et Harold Noel

⁷ Serafin Gutierrez



Oiseaux

Allemagne

Un premier cas aviaire a été détecté le 06/07/2022 sur un Harfang des neiges (*Bubo scandiacus*) captif dans un zoo du land de Saxe-Anhalt. Sur quatre individus confirmés, un est mort (source : Commission Européenne ADIS le 18/07/2022). Cette semaine, le pays a notifié trois foyers chez des oiseaux captifs détectés entre le 29 et 31/08/2022 en Saxe, Saxe-Anhalt et à Berlin. Il s'agit de la première détection de la saison dans le land de Saxe, non loin de la frontière avec la République Tchèque. La Saxe avait déjà détecté des cas l'année précédente (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022).

Un cas dans l'avifaune sauvage libre a été détecté le 26/08/2022 sur un faucon (espèce non précisée) trouvé mort dans la région de Berlin (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022).

Autriche

Première détection au sein de l'avifaune sauvage cette saison le 17/08/2022 chez un aigle royal (*Aquila chrysaetos*) (source : Commission Européenne ADIS le 05/09/2022).

Espagne

Première détection cette saison chez un autour des palombes (*Accipiter gentilis*), le 10/08/2022 (source : Commission Européenne ADIS le 05/09/2022).

Italie

Au total, 110 cas dans l'avifaune, dont dix sur les quatre dernières semaines, ont été détectés dans la partie nord du pays (Vénétie, Emilie-Romagne, Lombardie, Piémont et Frioul-Vénétie julienne) et en Sardaigne cette saison (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022). La première détection, en date du 10/06/2022, était conforme aux dates habituelles de début de saison. Pour rappel, un cas avait été détecté le 19/01/2022 à l'inter-saison en région Ombrie en Italie centrale, sur un autour des palombes (*Accipiter gentilis*) (source : Commission Européenne ADIS le 11/07/2022). En 2021, le début de saison avait été plus précoce, avec un premier cas détecté le 16/04/2021 chez un oiseau captif à Berlin en Allemagne (source : Bilan West Nile 2021). Deux cas ont été détectés dans la région d'Emilie-Romagne (dans le nord du pays) le 08/07/2022 sur une corneille noire (*Corvus corone*) et le 11/07/2022 sur une pie bavarde (*Pica pica*) (source : Commission Européenne ADIS le 25/07/2022).

Les analyses phylogénétiques sur les oiseaux ont permis d'identifier le lignage 1 en Vénétie (régions de Venise et Rovigo) sur des spécimens capturés en juin 2022. Le lignage 2 a également été identifié dans la région de Rovigo sur des spécimens capturés sur la même période (source : [Eurosurveillance le 21/07/2022](#)).

Équidés

Allemagne

Premières détections cette saison chez deux équidés le 22/07 et le 15/08/2022 (source : Commission Européenne ADIS le 05/09/2022). Un nouveau foyer équin a été détecté dans la région de Hambourg le 26/08/2022 (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022).

Autriche

Première détection cette saison le 23/08/2022 (source : Commission Européenne ADIS le 05/09/2022).

Croatie

Les deux premiers foyers équins de la saison ont été détectés le 26 et 31/08/2022 dans le cadre de la surveillance programmée nationale. Le premier est en région de Zagreb, tandis que le second est situé à environ 200 km, dans l'est du pays non loin de la Serbie (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022).

Espagne

Première détection cette saison chez un équidé le 17/08/2022 (source : Commission Européenne ADIS le 05/09/2022).

France

Le premier foyer équin en France de la saison 2022 a été détecté chez une jument le 06/08/2022 dans le Var (83) au sein d'une exploitation comptant 41 équidés. Le laboratoire national de référence de l'Anses pour la fièvre West Nile a



confirmé le foyer sérologiquement (Immunoglobulines M et G) (source : commission européenne ADIS le 16/08/2022). Les IgM sont détectables dès le 8ème jour de la maladie et persistent jusqu'à 2 à 3 mois après l'infection⁸. Leur présence indique donc une infection récente.

La jument, actuellement en suivi clinique, était ataxique depuis le samedi 6 août, présentait une hyperthermie modérée à 38,8°C, une hypersensibilité au toucher et des symptômes neurologiques.

Grèce

Un second cas équin a été détecté le 02/09/2022 en Macédoine-Thrace, dans le même secteur que le précédent foyer détecté le 18/08/2022 (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022).

Italie

Les premiers foyers de la saison sur les équidés ont été détectés le 12 et 19/07/2022 dans deux élevages (n=1/9 et n=1/26) en Vénétie dans le district de Padoue en Italie (source : Commission Européenne ADIS le 01/08/2022). Cette semaine, le pays a notifié quatre foyers équins détectés entre le 22 et 30/08/2022 : un en Vénétie, deux en Emilie-Romagne et un en Lombardie. L'incidence mensuelle est de six foyers détectés sur les quatre dernières semaines (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022).

Point sur les dernières saisons en France (Source : LNR le 16/08/2022)

Des épizooties de virus West-Nile ont été reportées en France dans le bassin méditerranéen et plus particulièrement en région Camargue, dans le Gard et les Bouches-du-Rhône en 2000, en 2008 et 2015 (49 cas reportés). Ces épizooties étaient dues à différentes souches de virus appartenant à WNV lignée 1.

Depuis 2015, les saisons de transmission de WNV sont moins intenses. En 2018, année exceptionnelle en terme de circulation de WNV en Europe, la France a reporté 13 cas équin d'infection avec des premiers cas détectés en Corse, dans le Var et dans les Bouches-du-Rhône. Pour la première fois la circulation de la lignée 2 de WNV a été mise en évidence sur le territoire dans l'avifaune. Les deux souches de WNV circulent donc en France depuis 2018. Le nombre de cas d'infection reste cependant faible ces cinq dernières années (2018: 13 cas, 2019: huit cas, 2020: cinq cas, 2021: aucun cas, 2022: un cas à ce jour) avec un début d'apparition des symptômes établi entre mi-août (en 2020 en Corse), fin août (en 2019) et fin septembre (en 2018). L'année 2022 ne semble pas être une année particulière concernant la situation épidémiologique locale et temporelle de WNV.

Surveillance entomologique en Italie

Les pools de moustiques capturés en Vénétie fin juin et début juillet ont mis en évidence la co-circulation de ces deux lignages, avec la détection du lignage 1 dans les provinces de Venise et de Padoue, et du lignage 2 dans les provinces de Vicence, Padoue, Venise, Vérone et Rovigo. La détection chez les moustiques est précoce (par rapport aux autres volets de la surveillance : avifaune, équidés et humains), avec une première détection sur un pool de moustiques *Culex*, capturés le 07/06/2022 dans la province de Vicence en Vénétie (source : [Eurosurveillance le 21/07/2022](#)).

Les souches du lignage 1 identifiées en 2022 sont proches de celles identifiées en 2021. Ensemble, elles forment un sous-groupe distinct au sein du sous-type méditerranéen occidental clade a, ce qui est en faveur d'une nouvelle introduction de cette lignée en 2021. En 2022, une extension vers de nouvelles provinces de Vénétie est signalée. Ces séquences sont très proches des séquences identifiées en Camargue en 2015, 2018 et 2020 (Constant et al., 2022, [Eurosurveillance le 21/07/2022](#); L'Ambert et al., 2021 [BioRxiv](#)).

Les souches de lignage 2 identifiées en 2022 sont proches de celles précédemment détectées depuis 2016 en Vénétie, et sont proches des souches d'Europe Centrale et méridionales (source : [Eurosurveillance le 21/07/2022](#)).

Humains

L'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) publie tous les vendredis un bilan hebdomadaire des cas humains de fièvre de West Nile (Source: [ECDC Weekly updates](#)). Le tableau 1 présente le nombre de cas humains déclarés depuis le début de la saison, c'est à dire depuis le 01/06/2022. On note 21 décès en Italie, quatorze en Grèce, un en Roumanie et sept en Serbie depuis le début de la saison.

En Italie, les analyses phylogénétiques ont identifié le lignage 2 sur un cas détecté le 18/06/2022 en province de Venise et le lignage 2 sur un cas détecté le 28/06/2022 dans la province de Padoue. A noter qu'une portion de séquence (182 nucléotides du gène de la protéine non structurale 5) des souches de lignage 1 issues de cas humains en 2021 et 2022 sont identiques aux séquences détectées chez les moustiques et les oiseaux (source : [Eurosurveillance le 21/07/2022](#)).

⁸ <https://respe.net/maladie-equine/maladies-reglementees/fievre-de-west-nile/>




Figure 2 : Incidence hebdomadaire (nombre de cas et foyers détectés par semaine) chez l’avifaune, les équidés et les humains et sa moyenne glissante sur deux semaines depuis le 01/06/2022 dans les pays d’Europe UE et voisins. **Pour les foyers et cas animaux, les dates de suspicion sont utilisées, tandis que pour les cas humains ce sont les dates de notification. Compte tenu des délais entre la suspicion et notification des événements, les dernières semaines peuvent être incomplètes** (source : Commission Européenne ADIS et ECDC weekly dataset consultés le 12/09/2022).



Tableau 1 : Nombre de cas et foyers détectés chez l'avifaune, les équidés et les humains depuis le 01/06/2022 dans les pays d'Europe UE et voisins (source : Commission Européenne ADIS et ECDC weekly dataset consultés le 12/09/2022).

| Pays | Date de détection du premier événement | Avifaune libre ou captive | Équidés | Humains |
|-----------|--|---------------------------|---------|---------|
| Allemagne | 06/07/2022 | 20 | 3 | 1 |
| Autriche | 04/08/2022 | 1 | 1 | 2 |
| Croatie | 26/08/2022 | 0 | 2 | 0 |
| Espagne | 10/08/2022 | 1 | 1 | 0 |
| France | 06/08/2022 | 0 | 1 | 0 |
| Grèce | 23/06/2022 | 0 | 2 | 155 |
| Hongrie | 08/08/2022 | 0 | 2 | 7 |
| Italie | 10/06/2022 | 110 | 28 | 383 |
| Roumanie | 15/07/2022 | 0 | 0 | 21 |
| Serbie | 24/06/2022 | 0 | 0 | 125 |
| Slovaquie | 01/07/2022 | 0 | 0 | 1 |
| Europe | 10/06/2022 | 132 | 40 | 695 |

Première notification officielle de foyer en Algérie (source : LNR et Santé Publique France)

L'Algérie a notifié pour la première fois des foyers équin de fièvre West Nile le 06/09/2022. Sept foyers ont été détectés à partir du 03/08/2022 dans un rayon de 10km dans la wilaya de Touggourt au Nord-Est du Sahara, à environ 500 km d'Alger et 150 km de la Tunisie. La notification ne précise pas les symptômes associés (source : WAHIS-OMSA [notification immédiate le 06/09/2022](#)).

La fièvre de West Nile est enzootique en Afrique du Nord. Des foyers équin ont été officiellement déclarés en Tunisie en 2015 et 2018 (source : WAHIS-OMSA [rapport de suivi le 22/01/2019](#)).

Cette première déclaration revêt une importance particulière en termes de santé publique en raison de l'intensité des échanges et des voyages avec les pays du Maghreb. Peu d'informations sont disponibles dans ces pays sur les cas humains. A plusieurs reprises des cas humains contaminés en Algérie ont été diagnostiqués en France.

Pour en savoir plus

Le bilan de la saison West Nile 2021 est présenté sur le site de la plateforme ESA ([lien](#)). Les vidéos de diffusion du virus de 2017 à 2021 sont également disponibles ([lien](#)).



Les dangers sanitaires pour lesquels l'évolution de la situation épidémiologique est faible ou nulle depuis plus de deux semaines mais pour lesquels un suivi hebdomadaire de la situation est maintenu sont traités dans la section suivante. Les derniers événements sanitaires sont rappelés. Un renvoi vers le dernier BHVSI-SA ou la dernière note bilan de la Plateforme sur le sujet est ajouté.

| | | |
|---|--|--|
| | | Rage classique en Europe : un nouveau cas sauvage en Moldavie et un nouveau foyer en Roumanie |
| <p>Section rédigée en collaboration avec le LNR rage⁹.</p> <p><i>Nota bene</i> : Seuls les cas de rage classique (RABV), à déclaration obligatoire auprès de la Commission européenne, sont traités dans le BHVSI-SA. La rage des chauves-souris, détectée en 2020 dans de nombreux pays, n'est donc ni traitée ni représentée sur la carte. Sauf mention spécifique, les cas de franchissement de barrière d'espèce (virus rabiques de chauves-souris, comme par exemple EBLV ou WCBV, détectés exceptionnellement sur mammifères non-volants) ne sont pas traités non plus dans ce bulletin.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Moldavie : Un nouveau cas de rage a été détecté le 30/08/2021 sur un renard (des chiens, chats, suidés et équidés sont également détenus sur le site). Il s'agit du sixième cas/foyer rapporté par la Moldavie en 2022 (source : Commission Européenne ADIS le 12/09/2022). La Moldavie avait déclaré dix-neuf cas et foyers au premier semestre 2021 et aucun au second semestre 2021 (source : Commission européenne ADIS le 25/07/2022). • Pologne : un nouveau cas de rage a été détecté chez un renard roux le 29/07/2022 dans la voïvodie de Mazovie. La Pologne a totalisé 112 cas et foyers en 2021 et 36 depuis le début de l'année 2022 (Source : Commission européenne ADIS le 16/08/2022). Elle n'avait déclaré qu'un cas en 2019 (nombre de cas le plus bas historiquement) et sept cas en 2020 (Source : Commission européenne ADIS le 30/08/2021). L'augmentation du nombre de cas et foyers détectés est due en partie à un renforcement de la surveillance dans les zones où des cas de rage ont été confirmés chez des renards. La majorité des cas sauvages a été détectée dans une zone libérée de rage depuis au moins seize ans où il n'y avait pas de campagne de vaccination orale des renards en 2019-2020. Cette zone est située à environ 40 km de la zone de vaccination située à la frontière avec la Biélorussie et l'Ukraine (source : OMS). Une présentation de la situation en Pologne à la frontière avec l'Ukraine a été faite au CPVADAAA du 10-11/02/2022 (lien). Les autorités sanitaires polonaises imposent dès à présent la vaccination contre la rage pour les chats, dans les zones infectées, et renforcent celle des chiens, qui est obligatoire depuis 2004, dans tout le pays. • Roumanie : un nouveau foyer de rage a été détecté le 28/08/2022 chez un bovin au nord-est du pays (source : Commission européenne ADIS le 12/09/2022). Un premier cas en 2022 avait été détecté le 28/03/2022 sur un renard dans la même région et un premier foyer domestique, chez des bovins le 02/03/2022 dans le nord-ouest du pays. La Roumanie avait déclaré cinq foyers domestiques de rage en 2021. • Est de l'Europe : les données mises à disposition par la Commission européenne et l'OMS-Europe montrent que dans les pays situés à l'est des frontières de l'UE, la rage est enzootique. Les données ADIS confirment que c'est le cas pour la Turquie et la Moldavie. En Turquie, un total de 187 cas ou foyers a été notifié en 2020 (source : Commission européenne ADIS au 10/11/2020). Un total de 142 cas de rage a été notifié en Turquie en 2021. Pour l'année 2022, au 24/07, 91 foyers ont été notifiés. En Ukraine et en Russie, la rage n'est pas déclarée au système ADIS. Cependant, la rage est aussi enzootique dans ces deux pays avec un nombre élevé de foyers domestiques et cas en faune sauvage (Données OMS-Europe) (source : Commission européenne ADIS au 24/07/2022). | | |

⁹ Emmanuelle Robardet, Florence Cliquet, Alexandre Servat




Figure. Localisation des foyers domestiques et cas sauvages de rage du 01/01/2022 au 11/09/2022 en Europe et en Turquie (source : Commission européenne ADIS au 12/09/2022). **Les foyers liés à des animaux importés ne figurent pas sur la carte.**



Les textes en gris clair reprennent des textes de la(des) semaine(s) précédente(s).

| | | | |
|--|---|--|---|
| + | Nouvelle fiche | | Fiche actualisée |
| Situation épidémiologique | | | |
| | Pas ou peu d'évolution significative de la situation épidémiologique | | Situation épidémiologique en évolution : favorable |
| | | | Situation épidémiologique à surveiller |
| | | | Situation épidémiologique en évolution : défavorable |
| | | | Situation épidémiologique préoccupante |
| Risque pour les compartiments | | | |
| | D | Animaux Domestiques (Arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d'animaux domestiques) ou Détenus , dont la faune sauvage captive | |
| | S | Animaux Sauvages libres | |
| | H | Humain | |
| Plusieurs combinaisons possibles, exemple : | Coloration orange | Le compartiment est réceptif +/- sensible à l'agent pathogène | |
| | Coloration grise | Le compartiment n'est ni sensible ni réceptif à l'agent pathogène | |

Les différentes sources de données utilisées pour les activités de Veille Sanitaire Internationale (VSI) et les modalités d'élaboration du bulletin hebdomadaire de veille sanitaire internationale en santé animale (BHVSI-SA) sont détaillées via le bouton ci-contre :

Sources de données pour la VSI

Les archives de BHVSI-SA sont disponibles ci-contre :

BHVSI-SA

Ce bulletin n'engage que son comité de rédaction et non les organismes membres de la Plateforme.

Pour toutes questions : plateforme-esa@anses.fr.

Ce document créé dans le cadre de la Plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale (ESA) peut être utilisé et diffusé pour tout ou partie par tout média à condition de ne pas apporter de modification au contenu et de citer la source comme suit " © <https://www.plateforme-esa.fr/>"

Pour s'abonner