Veille Sanitaire Internationale
Plateforme ESA

Note du 03/10/2025

Fièvre catarrhale ovine en Europe : suivi de situation des BTV (point au 03/10/2025)

Résumé : Cette note présente le suivi de situation en 2025 de la fièvre catarrhale ovine (FCO) de sérotypes émergents en Europe ou des sérotypes déjà présents mais en expansion dans une nouvelle zone ou non encore détectés en France. Le décompte du nombre de foyers dans cette note débute au 01/01/2025 (sauf pour les pays dont les comptages fournis par les autorités sanitaires débutent avec la fin de la période d'inactivité vectorielle) et se termine au 03/10/2025. A noter que les dates de début de saison d'activité vectorielle ainsi que les modalités de surveillance peuvent varier selon les pays.

En l'absence de notification hebdomadaire par les pays et de la disparité des programmes de surveillance nationaux, le suivi de situation ultérieur à cette note se focalisera uniquement sur les sérotypes émergents en Europe, avec une attention particulière pour les principaux pays exportateurs de bovins, ovins et caprins vivants et de semences vers la France, dont les principaux sont (par ordre alphabétique) : Allemagne, Autriche, Belgique, Hongrie, Luxembourg, Irlande, Italie, Pays-Bas, Roumanie et Suisse (source : TRACE-NT avec l'outil UTOPIA.).

Pour le comité de rédaction de la Plateforme ESA : François Boucher (DGAL), Julien Cauchard (Anses), Céline Dupuy (Anses), Guillaume Gerbier (DGAL), Jennifer Pradel (Cirad), Carlène Trévennec (INRAE)

Pour la DGAL : Sophia Denorre

Pour le Laboratoire National de Référence FCO (Anses) : Emmanuel Breard ; Corinne Sailleau ; Stéphan Zientara

Pour GDS France : Emmanuel Garin

Pour la SNGTV : Charlotte Warembourg

Pour l'unité ASTRE du Cirad : ClaireGarros

Auteur correspondant : plateforme-esa@anses.fr

À propos de la réglementation UE relative à la fièvre catarrhale (BTV 1-24)

L'infection par le bluetongue virus (BTV) est une maladie réglementée par le règlement (UE) 2016/429 qui classe l'infection par le BTV parmi les maladies de catégorie CDE, ce qui implique la mise en place :

- de mesures de restrictions de mouvements en cas de détection de foyers cliniques sur le territoire,
- d'une surveillance évènementielle et programmée
- d'une déclaration obligatoire des cas cliniques

Un État membre peut décider de mettre en place un programme d'éradication mais ce n'est pas obligatoire comme dans le cas des maladies classées ADE ou BDE (source : Commission européenne lien).
Dans les États membres (ou parties d'État membre au sens de la territorialisation européenne), lorsqu'un sérotype exotique de BTV est détecté, cela engendre une notification immédiate du foyer. Dans ce cas, soit un zonage permettant de distinguer une zone indemne d'une zone réglementée d'au moins 150 km est instauré, soit le sérotype est considéré directement comme enzootique. L'État membre effectue des notifications hebdomadaires si la zone réglementée évolue du fait des nouveaux foyers. Dans le cas contraire, le rapportage auprès de la Commission européenne est réalisé au 30 avril pour l'année précédente. L'État membre déclare dans ce rapport annuel, la date du dernier foyer et la liste des sérotypes enzootiques.
Cela peut biaiser les représentations (cartes et autres figures) dans cette fiche.

Au niveau international hors UE, le BTV est une maladie répertoriée dans la liste des maladies du Code sanitaire pour les animaux terrestres de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) et doit à ce titre faire l'objet d'une déclaration obligatoire dans la base WAHIS.

Une épizootie de fièvre catarrhale ovine (FCO) de sérotype 3 a débuté aux Pays-Bas autour d'Amsterdam le 06/09/2023. Le virus s'est propagé dans tout le pays. Il a été détecté en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni à l'automne et pendant l'hiver 2023. Il s'est ensuite propagé vers l'Europe de l'Est au dernier trimestre 2024 et a gagné notamment l'Autriche et la Pologne au premier trimestre 2025. Le premier foyer en France a été détecté le 05/08/2024. Le BTV 3 a ensuite été détecté au Portugal le 24/08/2024 et en Espagne le 17/09/2024.

En parallèle, une épizootie due à une nouvelle souche de FCO de sérotype 8 (BTV8 France 2023) a débuté en France le 04/08/2023 et s'est propagée sur plus de la moitié du territoire. Ce sérotype s'est ensuite propagé sur la péninsule ibérique, la Suisse et la Sardaigne dès la fin 2023. En 2024 et 2025, il poursuit son extension en France et vers l'Europe de l'Est.

D'autres sérotypes émergents, causant moins de foyers mais dont la surveillance est tout aussi nécessaire, sont détectés de manière sporadique, comme le BTV1 en Espagne, BTV4 dans le centre de l'Europe (Autriche, Slovénie), BTV5 en Italie, BTV12 au Pays-Bas et en Angleterre.

Les figures 1 et 2 et le tableau 1 présentent la liste des sérotypes détectés et déclarés dans les différents pays d'Europe sur les trois dernières années (2023 à 2025). La figure 11 située en fin de document présente le statut officiel des pays déclaré à la Commission européenne.



Figure 1. Pays européens ayant détecté des sérotypes de FCO sur les trois dernières années (2023 à 2025), d'après les données de déclaration nationales disponibles en ligne au 03/10/2025. Cette carte ne prend pas en compte les sérotypes enzootiques, qui ne font pas l'objet de déclaration immédiate. NB : certains sérotypes ne sont présents qu'en zone ou compartiment restreint, notamment le BTV4 en France).



Figure 2. Pays européens ayant détecté des sérotypes de FCO, représentés par sérotype, sur les trois dernières années (2023 à 2025), d'après les données de déclarations nationales disponibles en ligne au 03/10/2025. Cette représentation ne prend pas en compte les sérotypes enzootiques, qui ne font pas l'objet de déclaration immédiate. NB : certains sérotypes ne sont présents qu'en zone ou compartiment restreint, notamment le BTV4 en France).

Tableau 1. Sérotypes de FCO détectés sur les trois dernières années (2023 à 2025) par pays d'Europe, d'après les données de déclaration disponibles en ligne au 03/10/2025.

Pays	BTV1	BTV3	BTV4	BTV5	BTV8	BTV12	Source
Allemagne		2025					TSIS
Autriche		2025	2025		2025		AGES
Belgique		2024					Sciensano (pas d'information depuis 11/2024)
Bosnie-Herzégovine					2025		WAHIS, ADIS
Bulgarie					2025		WAHIS, ADIS
Croatie			2024		2025		WAHIS
Danemark		2025					DVFA
Espagne	2025	2025	2025		2025		MAPA
France		2025	2025*		2025		Rapport semestriel Commission européenne, LNR
Grèce		2025			2025		WAHIS
Hongrie		2025					NEBIH
Italie	2025	2025	2025	2025	2025		BENV, WAHIS
Luxembourg		2024					ADIS

Pays	BTV1	BTV3	BTV4	BTV5	BTV8	BTV12	Source
Macédoine du Nord					2025		Autorités nord macédoniennes
Montenegro					2025		WAHIS
Norvège		2025					Veterinary Institute
Pays-Bas		2024				2024	NVWA
Pologne		2025					WAHIS
Portugal		2024	2023		2025		DGAV
République Tchèque		2025					SVS
Roumanie		2025					WAHIS, ADIS
Royaume-Uni		2025			2025	2024	APHA
Serbie					2025		WAHIS, ADIS
Slovénie			2025		2025		WAHIS, ADIS
Suède		2024					SVA
Suisse		2025			2025		OSAV

*Zone ou compartiment

État de situation en 2025, par ordre alphabétique des pays

Allemagne (BTV3)

Le premier foyer de sérotype 3 a été détecté le 10/10/2023, puis le virus s'est largement répandu en 2024. En 2025, au 03/10/2025, 1 925 foyers de BTV3 ont été détectés, répartis dans le pays (16 Länder). Les détections sont concentrées sur le premier semestre 2025, avec un minimum observé sur les mois de juin et juillet, et une reprise des détections pendant l'été (source : FLI-TSIS le 03/10/2025).



Figure 3. Nombre de foyers de BTV3 détectés en 2025 et déclarés par district (source : FLI-TSIS le 03/10/2025).

Autriche (BTV3, BTV4, BTV8)

Après 8 ans sans aucune détection, le BTV a ré-émergé en septembre 2024 (BTV3 et BTV4). En août 2025, le premier cas de BTV8 a été rapporté dans le sud du pays, près de la frontière italienne. En 2025, au 02/10/2025, 283 foyers de BTV3, 63 foyers de BTV4, 651 foyers de BTV8, 26 foyers non typés et 125 foyers cliniques dits *confirmés* ont été détectés (période de détection entre le 01/07/2025 au 09/09/2025). Ces foyers ont été détectés en partie par surveillance programmée (60 bovins non vaccinés sont testés trimestriellement dans 28 régions). Compte tenu de l'épizootie actuelle, le nombre d'animaux testés a été augmenté. La vaccination est volontaire et à la charge des éleveurs (source : agence sanitaire autrichienne AGES le 02/10/2025).



Figure 4. Répartition des sérotypes de BTV3, BTV4 et BTV8, ainsi que des élevages dépistés négatifs (n=1 201) en Autriche depuis le 01/07/2025 (source : AGES le 02/10/2025).

Belgique (BTV3, absence de données disponibles depuis 11/2024)

Le pays a perdu son statut de pays indemne depuis la détection du BTV3 le 10/10/2023, introduit depuis les Pays-Bas. Durant l'année 2024, le virus s'est propagé dans le tout le pays. La Belgique n'a pas fourni de mise à jour sur la FCO sur son site depuis le mois de novembre 2024. Les campagnes de vaccinations sont en cours en 2025 (source : Santé Publique Sécurité de la Chaîne Alimentaire page FCO, Sciensano non disponible depuis décembre 2024, consultés le 22/09/2025).

Bosnie-Herzégovine (BTV8)

Les premiers foyers de BTV8 ont été détectés le 25/09/2025. En date du 03/10/2025, sept foyers en élevages ovins ont été déclarés dans trois régions administratives différentes (source : Commission européenne ADIS le 03/10/2025).

Bulgarie (BTV8)

Le premier foyer de BTV8 (nouvelle souche) a été déclaré le 29/07/2025, dans un troupeau de 25 moutons. Le site était isolé dans une zone montagneuse difficile d'accès. Des mesures de contrôle des vecteurs ont été mises en place pour limiter la propagation. Un deuxième foyer a été signalé le 08/08/2025 dans un troupeau de 323 moutons. Au total, au 22/09/2025, sept foyers FCO BTV8 ont été déclarés en 2025 (source : WAHIS-OMSA évènements 6713 et 6686 consultés le 03/10/2025).

Croatie (BTV4, BTV8)

La Croatie a signalé un premier foyer de BTV8 (nouvelle souche) le 27/07/2025, impliquant deux bovins sur une ferme comptant également des chèvres et des moutons. Le dernier rapport de notification en date du 17/09/2025 fait état de 127 foyers, concernant en très grande majorité des élevages d'ovins. La Croatie avait également connu des foyers de BTV4 fin 2024 (source : WAHIS-OMSA évènements 6680 et 6681 consultés le 03/10/2025).

Danemark (BTV3)

Le BTV3 a été détecté pour la première fois le 09/08/2024 et s'est répandu dans tout le pays en 2024. En 2025, 101 foyers de BTV3 ont été rapportés, la majorité sur les mois de janvier à mars. Les autorités précisent que la saison

2025-2026 a débuté le 15/05/2025. Au total, huit foyers ont été détectés entre le 15/05 et le 19/09/2025 (source : autorités danoises Danish Veterinary Food Administration DVFA actualisé le 03/10/2025, consulté le 03/10/2025).

Figure 5. Répartition des foyers confirmés de BTV3 (rouge) et suspicions cliniques (bleu) au Danemark en 2025 (source : DVFA actualisé le 03/10/2025, consulté le 03/10/2025).

Espagne (BTV1, BTV3, BTV4, BTV8)

En 2025, 105 exploitations ont détecté la FCO, dont de nombreux foyers en co-infection par différents sérotypes. Les sérotypes BTV3 et BTV8 sont majoritaires, détectés dans la quasi-totalité du pays, 68 exploitations de 14 provinces (Andalousie, Aragon, Asturies, Baléares, Cantabrie, Castille-La Manche, Castille-et-Léon, Catalogne, Estrémadure, Galice, La Rioja, Murcia, Navarre, Pays Basque) pour le BTV3 et 46 exploitations de 12 provinces (Andalousie, Aragon, Cantabrie, Castille-La Manche, Castille-et-Léon, Catalogne, Estrémadure, Galice, La Rioja, Murcie, Navarre, Pays Basque) pour le BTV8. Les sérotypes BTV1 et BTV4 circulent dans le sud du pays, dans 2 provinces (Andalousie et Estrémadure) où ils ont été détecté respectivement dans 18 exploitations et cinq exploitations (source : notifications des autorités espagnoles Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación MAPA consulté le 23/09/2025). Un programme national de surveillance a été mis en place, incluant des contrôles sérologiques et cliniques ainsi que la surveillance des vecteurs (source : programme de surveillance, juillet 2025).



Figure 6. Distribution des sérotypes de BTV3 (violet), BTV8 (rose), BTV1, 3 et 8 (orange) en Espagne dans les provinces où le virus BTV a été confirmé sur la saison 2024-2025 (source : MAPA le 24/09/2025).

France (BTV3, BTV4, BTV8)

En 2025, deux souches de BTV (BTV3 et BTV8) sont présentes sur la quasi-totalité du territoire hexagonal. Pour rappel, la souche BTV3, d'origine néerlandaise, a émergée dans le nord de la France en aout 2024 et une nouvelle souche de BTV8 a émergé en août 2023, en Aveyron, et s'est propagée sur tout le territoire français et jusqu'en Corse (en 2023 et 2024). En Corse, en 2025, seuls le BTV4 et une souche de BTV3 (d'origine sarde, issue d'un réassortant entre les souches sardes BTV3 et BTV4) circulent. Ce sérotype n'a pas été isolé en France hexagonale depuis 2018 (source : LNR, DGAL le 03/10/2025, page FCO du MASA le 03/10/2025, GDS France actualisé le 18/09/2025).

Grèce (BTV3, BTV8)

Le BTV3 est détecté depuis le 18/09/2024. Au total, 36 foyers ont été détectés, dont trois foyers en 2025 (source : WAHIS-OMSA évènement 5927 consulté le 03/10/2025). Le BTV8 (nouvelle souche) a été détecté pour la première fois le 02/10/2024. En 2024, 73 foyers ont été déclarés, sur les mois d'octobre et novembre 2024 (dernier foyer le 27/11/2024) (source : WAHIS-OMSA évènement 5960). En 2025, au 22/09/2025, 40 foyers ont été notifiés, tous détectés après le 02/07/2025. La majorité des foyers concernent des troupeaux de moutons (source : WAHIS-OMSA évènement 6605 consulté le 03/10/2025).

Hongrie (BTV3)

Le premier foyer de BTV3 a été confirmé le 04/09/2025, détecté un élevage de bovins dans le cadre du programme national de surveillance programmée. Au 03/10/2025, quatre foyers ont été notifiés (source : Commission européenne ADIS le 03/10/2025, Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NEBIH) le 11/09/2025 - Office national de la chaîne alimentaire). La Hongrie était officiellement indemne de FCO depuis 2021 (source : NEBIH consultée le 05/03/2021).

Irlande

L'Irlande est indemne de FCO (source : autorités irlandaises Department of Agriculture, Food and the Marine (DAFM) consultée le 19/09/2025).

Italie (BTV1, BTV3, BTV4, BTV5, BTV8)

En 2025, le pays a déclaré 1 417 foyers de FCO de sérotypes BTV1, BTV3, BTV4 et BTV8. Le BTV8 représente actuellement près de 80 % des foyers sur cette saison. Ce sérotype est apparu sur le territoire fin 2023, avec les premiers foyers détectés en Sardaigne. En 2025, le pic de détection a été observé au mois de juillet (466 exploitations atteintes, dont des foyers de co-infection avec les sérotypes BTV3 ou BTV4). Le BTV3 représente le second sérotype le plus fréquemment identifié. La majorité des détections sont en Sardaigne, et des foyers isolés ont été détectés dans le Latium, en Lombardie, dans le Piémont et Ombrie. Une souche de BTV3 est présente en Sardaigne depuis 2018. Durant l'été 2024, une augmentation des détections de ce sérotype suggérait l'introduction de la souche qui a émergé fin 2023 aux Pays-Bas. Le BTV4 est présent dans plusieurs régions d'Italie continentale et représente moins de 8 % des détections de FCO en 2025. Le BTV1 a été détecté le 11/08/2025 dans deux exploitations ovines en Campanie (source : Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario (BENV) le 22/09/2025).

Le BTV5 a été détecté pour la première fois le 28/08/2025, dans le Sud Sardaigne. Le virus a été confirmé sur trois ovins d'un troupeau de plus de 300 têtes (source : WAHIS-OMSA notification immédiate le 30/09/2025).

La majorité des foyers de FCO concerne des moutons, mais des cas ont également été signalés chez les bovins, les chèvres, les alpagas et un yak.



Figure 7. Répartition des sérotypes de BTV1, BTV3 et BTV8 en 2025 en Italie (foyers confirmés en rouge, foyers éteints en gris) (source : BENV le 03/10/2025).

Luxembourg (BTV3, aucune déclaration en 2025)

Le BTV3 a été détecté en juillet 2024, et deux premiers foyers ont été notifiés à la commission européenne. Au 08/08/2024, 28 foyers avaient déjà été confirmés (sources : autorités luxembourgeoises le 08/08/2024) Au 12/09/2025, aucune déclaration n'a été faite en 2025 (source : Commission européenne ADIS le 03/10/2025).

Macédoine du Nord (BTV8)

Un premier foyer de BTV8 avait été détecté le 14/10/2024, puis un second le 20/06/2025. En 2025, 38 foyers ont été notifiés, en date du 22/09/2025. Ces foyers concernent des troupeaux de moutons, avec quelques cas dans des troupeaux mixtes de moutons et chèvres (source : WAHIS-OMSA évènement 6572 le 01/10/2025). Les autorités ont recensé davantage de foyers répartis sur tout le territoire (source : autorités nord macédoniennes le 03/10/2025).

Monténégro (BTV8)

Un premier foyer de BTV8 a été détecté le 09/09/2025 dans un élevage de bovins ayant présenté des signes cliniques (source : WAHIS-OMSA évènement 6817 notification immédiate le 26/09/2025).

Norvège (BTV3)

Le premier foyer a été détecté le 21/08/2024 dans un élevage d'ovins. En 2024, le virus s'est propagé sur le littoral sud du pays, dans les élevages ovins et bovins (source : WAHIS-OMSA évènement 5856). Les déclarations de foyers se sont poursuivies en 2025 avec une diminution du nombre de foyers entre avril et juillet. Les autorités ont signalé le premier foyer de la saison estivale 2025 le 01/08/2025 sur un bovin (contrôle au mouvement). Au total sur 2025, 37 foyers ont été déclarés au 19/09/2025, toujours localisés dans le sud du pays (source : WAHIS-OMSA événement 6292, autorités norvégiennes Veterinary Institute le 19/09/2025).

Pays-Bas (BTV3, BTV12, aucune déclaration en 2025)

Aucun cas de BTV n'a été signalé aux Pays-Bas en 2025. En 2024, le pays avait confirmé 8 942 foyers de BTV3 et 12 foyers de BTV12 par RT-PCR, ainsi que 2 116 suspicions cliniques non confirmées par épreuve de laboratoire (source : autorités néerlandaises Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) le 22/09/2025). Une nouvelle souche de BTV3 avait été détectée pour la première fois dans ce pays, et en Europe, le 05/09/2023 dans des élevages ovins (source : NVWA le 06/09/2025). Le BTV12, a été détecté pour la première fois fin 2024, mais ne semble pas

s'être propagé hors du pays (sauf un foyer au Royaume-Uni) (source : NVWA le 11/10/2024). En 2025, un nouveau système de surveillance a été mis en place, basé sur des échantillons mensuels collectés par des cliniques vétérinaires régionales (source : Wageningen university juillet 2025).

Pologne (BTV3)

Le premier foyer de BTV3 a été rapporté le 15/11/2024 dans le nord du pays. Trois autres foyers ont été rapidement déclarés le long de la frontière avec l'Allemagne et dans le nord. En 2024, quatre foyers de BTV3 ont été détectés. En 2025, au 03/10/2025, quatre foyers BTV3 ont été déclarés, dont un détecté en janvier, et trois autres entre juin et septembre 2025 (source : Commission européenne ADIS, WAHIS-OMSA évènements 6212, 6699, 6781, 6786, 6809 consultés le 03/10/2025).

Portugal (BTV3, BTV8, BTV1 en 2021, BTV 4 en 2023)

Les deux premiers foyers de BTV3 ont été signalés le 13/09/2024 dans des élevages ovins. En 2024, trois foyers ont été confirmés en fin d'année. Un foyer de BTV8 a été détecté le 25/10/2024.

En 2025, au 22/09/2025, un seul foyer a été déclaré à la Commission européenne, de sérotype 8 détecté le 24/08/2025. Les sérotypes BTV1 et BTV4 n'ont pas été détectés depuis 2021 et 2023 respectivement (source : Commission européenne ADIS, autorités portugaises Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) le 22/09/2025).

République Tchèque (BTV3)

Le premier foyer de BTV3 a été détecté le 04/09/2024 dans un élevage mixte de bovins, caprins et ovins à la frontière avec l'Allemagne. Le pays n'avait détecté aucun foyer de FCO depuis 15 ans. (source : autorités sanitaires tchèques Státní veterinární správa (SVS) le 06/09/2024). En 2024, de nombreux foyers BTV3 ont été détectés à proximité de la frontière avec l'Allemagne puis progressivement dans tout le pays (source : WAHIS-OMSA évènement, 5861, 6708 le 22/09/2025). Les autorités sanitaires ont signalé la reprise de l'activité vectorielle en date du 01/05/2025, et mis en place une zone de surveillance et de restriction couvrant dix régions du territoire (source : SVS le 30/04/2025). En date du 04/09/2025, le pays comptait 29 élevages confirmés par PCR depuis le 01/05/2025, avec un pic observé au mois d'août (source : SVS le 04/09/2025).



Figure 8. Répartition des sérotypes de BTV3 en République Tchèque en 2025 (source : SVS le 04/09/2025).

Roumanie (BTV3)

Le premier foyer de BTV3 a été détecté le 15/09/2025 sur un bovin. En date du 03/10/2025, quatre foyers ont été déclarés, dans des élevages de bovins dans le sud-ouest du pays, à proximité des frontières avec la Serbie et la Bulgarie (source : WAHIS-OMSA évènement 6828 le 30/09/2025). Il s'agit des premiers foyers de BTV détectés depuis 4 ans. Des foyers de BTV4 avaient été détectés en 2021 (source : Autoritatea Națională Sanitară Veterinară ANSVS consulté le 22/09/2025).

Royaume-Uni (BTV3, BTV8, BTV12 en 2024)

Le BTV3 a été détecté pour la première fois le 11/11/2023. En 2024, 265 foyers BTV3 ont été confirmés. En 2025, le premier foyer de BTV3 a été détecté le 11/07/2025 dans l'Oxfordshire, sur un ovin testé après avoir présenté des

signes cliniques. Deux cas chez des bovins ont également été identifiés dans le Hertfordshire lors de tests avant mouvement. En 2025, au 29/09/2025, 80 foyers de BTV3 ont été détectés, la grande majorité en Angleterre (source : agence sanitaire britannique Animal and Plant Health Agency (APHA) le 23/09/2025). Un unique foyer a été confirmé BTV12 en 2024. Aucune autre déclaration n'a été faite concernant ce sérotype en 2025 (source : APHA le 03/10/2025).

Le BTV8 a été détecté pour la première fois le 19/09/2025 sur un unique ovin qui avait présenté des signes cliniques (croûtes au niveau du mufle avec légers saignements, écoulement nasal, éraflures sur la lèvre supérieure, boiterie sans rougeurs/lésions). Les huit autres ovins présents sur le site ont tous été testés négatifs pour la FCO (source : WAHIS-OMSA évènement 6819 le 03/10/2025).



Figure 9. Répartition des sérotypes de BTV3 (triangle rouge) et BTV8 (triangle vert) au Royaume-Uni en 2025 et zone de restriction (plage colorée rouge) au 03/10/2025 (source : APHA le 03/10/2025).

Serbie (BTV8)

Le premier foyer de BTV8 a été détecté le 26/07/2025. En 2025, en date du 02/10/2025, 102 foyers ont été détectés et déclarés. La majorité des foyers confirmés sont sur des ovins, mais le virus a été confirmé sur des bovins et des caprins (source : WAHIS-OMSA évènement 6683 le 02/10/2025).

Slovénie (BTV4, BTV8)

Le premier foyer de BTV4 a été détecté le 27/01/2025, après 9 ans sans détection de ce sérotype. Au total en 2025 au 19/09/2025, deux foyers BTV4 ont été déclarés (source : WAHIS-OMSA évènement 6262). Le BTV8 a été détecté pour la première fois le 16/07/2025. Au total en 2025 au 19/09/2025, 60 foyers BTV8 ont été déclarés dans des élevages bovins et ovins (source : WAHIS-OMSA évènement 6662 le 19/09/2025).

Suède (BTV3)

Le BTV3 a été détecté pour la première fois les 04, 11 et 14/09/2024 dans trois élevages de bovins (source : Commission européenne ADIS le 22/09/2024). L'introduction du virus serait due à la propagation du vecteur depuis le Danemark. En 2025, au 30/04/2025, l'infection par le BTV3 a été confirmée dans 170 troupeaux ovins et 311 troupeaux bovins principalement des régions côtières. Les autorités sanitaires ont signalé quatre cas d'infection de veaux par le BTV3 depuis mai 2025, probablement infectés au stade in-utero, ce qui ne serait pas en faveur d'une propagation locale (source : autorités sanitaires Statens veterinärmedicinska anstalt SVA le 17/09/2025). La surveillance clinique est jugée efficace par les autorités suédoises. Des analyses de lait de tank ont été réalisées à

trois reprises en 2025 afin de surveiller la propagation géographique de l'infection (source : rapport de situation du SVA le 04/09/2025).



Figure 10. Résultat de surveillance du BTV3 entre le 1er mai 2025 et le 4 septembre 2025, négatif (rond bleu) et positif (triangle rouge) (source : rapport de situation du SVA le 04/09/2025).

Suisse (BTV3, BTV8)

Les sérotypes BTV3 et BTV8 ont été détectés pour la première fois en 2024. En 2025, ils continuent de circuler en Suisse. La période d'inactivité des vecteurs de la maladie de la langue bleue s'est terminée le 31/03/2025 (source : Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV consulté le 22/09/2025).



Figure 11. Carte des pays européens selon leur statut relatif à la FCO au 18/07/2025 : officiellement indemne (en vert), en cours d'éradication (en orange) et sans statut (en bleu) (source : Commission européenne consulté le 03/10/2025).

Pour en savoir plus

- Notes VSI précédemment publiées sur la FCO :
  - Fièvre catarrhale ovine en Europe : émergence de BTV3 aux Pays-Bas et émergence d'une nouvelle souche BTV8 en France (point au 11/12/2023) »,
  - Fièvre catarrhale ovine BTV3 (point au 29/10/2024)
  - Fièvre catarrhale ovine en Europe : situation au 11/03/2025
- DGAL : Fièvre catarrhale ovine (FCO) : situation en France, mesures de gestion et stratégie vaccinale (lien)
- GDS France : situation sanitaire de la FCO et de la MHE au 17/07/2025 (lien) et carte de situation de la FCO et de la MHE au 18/09/2025 (lien).
- Dates de fin de la période d'inactivité vectorielle selon les pays « Bluetongue Seasonally Vector free periods 2024 – 2025 » mis à jour le 15/05/2025 (source : UE le 15/05/2025).
- Commission Européenne CPVADAAA State of play of the situation on bluetongue and EHD measures, 17/06/2025.

Ce document créé dans le cadre de la Plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale (ESA) peut être utilisé et diffusé par tout média à condition de citer la source comme suit et de ne pas apporter de modification au contenu « © https://www.plateforme-esa.fr/ »